

**N° 379**

# **BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL**

Información hasta SE 45  
Año VIII | 24 de noviembre 2023  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires



## AUTORIDADES

Jefe de Gobierno

**Horacio Rodríguez Larreta**

Ministro de Salud

**Fernán González Bernaldo de Quirós**

Subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión en Red

**Daniel Carlos Ferrante**

Gerenta Operativa de Epidemiología

**Cecilia González Lebrero**

# EQUIPO DE LA GERENCIA OPERATIVA DE EPIDEMIOLOGÍA

Integrantes del Equipo de trabajo

**Enf. Jessica Natalia Agüero Sánchez**

**Dr. Cristián Biscayart**

**María Del Re**

**Dra. Susana Devoto**

**Lic. Yasmin El Ahmed**

**Bqca. María Aurelia Giboin Mazzola**

**Micaela López**

**Dra. Verónica Lucconi Grisolia**

**Dra. Deborah Sharff**

**Sebastian Tapuaj**

**Dra. Mónica Valenzuela**

**Dante Waisman**

**Lic. Hernán Zuberma**

*Data Entry*

**Germán Adell**

**Rosalía Páez Pérez**

**Bianca Spirito**

**Elisa Mariel Villaverde**

Integrantes de la Residencia Básica en  
Epidemiología

**Jefa de residentes: Dra. Agustina Villa**

**Lic. Camila Aquino**

**Lic. Sofía Harari**

**Dra. Sofía Monteverdi**

**Lic. Rocío Isabel Porro**

**Prof. Franca Salerno**

ISSN 2545-6792 (en línea)

ISSN 2545-7004 (correo electrónico)

Gerencia Operativa de Epidemiología  
Subsecretaría de Planificación Sanitaria  
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

<http://www.buenosaires.gob.ar/salud/epidemiologia>  
[gerenciaepicaba@buenosaires.gob.ar](mailto:gerenciaepicaba@buenosaires.gob.ar)

Tel.: 4123-3240

Monasterio 480, CABA

# INDICE

|                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. REPORTE DE ENFERMEDADES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.....</b>                                                                  | <b>7</b>  |
| <b>I.1. DETALLE DE LA NOTIFICACIÓN POR GRUPO DE EVENTOS .....</b>                                                                    | <b>10</b> |
| I.1.A. De transmisión vertical y sexual.....                                                                                         | 10        |
| I.1.B. Envenenamiento por animal ponzoñoso.....                                                                                      | 10        |
| I.1.C. Hepatitis.....                                                                                                                | 10        |
| I.1.D. Infecciones invasivas.....                                                                                                    | 10        |
| I.1.E. Inmunoprevenibles.....                                                                                                        | 10        |
| I.1.F. Intoxicaciones .....                                                                                                          | 10        |
| I.1.G. Lesiones intencionales.....                                                                                                   | 11        |
| I.1.H. Lesiones no intencionales.....                                                                                                | 11        |
| I.1.I. Meningitis y meningoencefalitis.....                                                                                          | 11        |
| I.1.J. Transmitidas por alimentos, agua o ruta fecal-oral.....                                                                       | 11        |
| I.1.K. Tuberculosis y lepra.....                                                                                                     | 11        |
| I.1.L. Zoonóticas y por vectores .....                                                                                               | 11        |
| <b>II. VIGILANCIA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS .....</b>                                                                            | <b>12</b> |
| <b>II.1. INTRODUCCIÓN .....</b>                                                                                                      | <b>12</b> |
| II.1.A. Nota metodológica .....                                                                                                      | 12        |
| II.1.B. Sobre el informe de IRA .....                                                                                                | 12        |
| <b>II.2. SITUACIÓN NACIONAL .....</b>                                                                                                | <b>12</b> |
| II.2.A. Vigilancia clínica.....                                                                                                      | 12        |
| II.2.B. Vigilancia de virus respiratorios en unidades de monitoreo de pacientes<br>ambulatorios (UMAS).....                          | 13        |
| II.2.C. Vigilancia de virus respiratorios en pacientes internados.....                                                               | 13        |
| <b>II.3. SITUACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. AÑOS 2019-2023 .....</b>                                                         | <b>13</b> |
| II.3.A. Vigilancia de laboratorio agrupada años 2019-2023.....                                                                       | 13        |
| II.3.B. Vigilancia clínica agrupada años 2019-2023.....                                                                              | 17        |
| II.3.C. Vigilancia de COVID-19, Influenza y otros virus respiratorios en personas<br>internadas.....                                 | 20        |
| II.3.D. Vigilancia de pacientes internados.....                                                                                      | 21        |
| II.3.E. Vigilancia de SARS-CoV-2, influenza y otros virus respiratorios (OVR) en<br>Unidades de Monitoreo de Ambulatorios (UMA)..... | 25        |
| II.3.F. Vigilancia de SARS-CoV-2, influenza y otros virus respiratorios (OVR) No<br>UMA .....                                        | 27        |
| <b>III. VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL MOSQUITO AEDES<br/>AEGYPTI .....</b>                                          | <b>30</b> |
| <b>III.1. INTRODUCCIÓN .....</b>                                                                                                     | <b>30</b> |
| III.1.A. Inicio presentación temporada 2023/2024.....                                                                                | 30        |
| III.1.B. Sobre el informe de las ETMAA.....                                                                                          | 30        |
| III.1.C. Nota metodológica .....                                                                                                     | 31        |
| III.1.D. Situación regional.....                                                                                                     | 31        |
| III.1.E. Situación actual en Argentina.....                                                                                          | 32        |
| <b>III.2. ETMAA EN LA CABA .....</b>                                                                                                 | <b>33</b> |
| III.2.A. Antecedentes y situación actual .....                                                                                       | 33        |
| <b>III.3. DENGUE .....</b>                                                                                                           | <b>34</b> |
| III.3.A. Situación en la temporada 2023/2024 (SE 27 a SE 47 2023).....                                                               | 34        |
| III.3.B. Casos históricos y comparación con los actuales.....                                                                        | 37        |

# BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

## EDITORIAL


¡Hola a todxs!

En el camino comenzado en 2016 fuimos incorporando, modificando e implementando nueva información con el propósito principal de retroalimentar el sistema de vigilancia, considerando la actividad y dándole importancia al trabajo de los distintos niveles locales. Cada persona que integra el sistema de salud genera información primaria valiosa y necesaria para la toma de decisiones.

La elaboración del BES, por lo tanto, es el reflejo vivo y dinámico de la realidad epidemiológica. Semana a semana emergen nuevos datos. En principio, producto de las nuevas notificaciones, luego, con el arduo trabajo que implica el análisis de cada caso en conjunto con los distintos actores involucrados: referentes de epidemiología de cada área programática de la Ciudad, laboratorios de la red y los de referencia, y la permanente interacción con el Ministerio de Salud de la Nación y con el resto de las jurisdicciones.

Transitamos un contexto sanitario global desafiante, pero al mismo tiempo lleno de oportunidades e innovación. Hemos atravesado enormes dificultades y es por esto que les agradecemos por habernos acompañado en este derrotero, esperando que sigan acompañándonos en lo que continúa.

¡Saludos de todos los que formamos parte de la GOE!.



**Cecilia González Lebrero**  
**Gerenta Operativa de**  
**Epidemiología**  
Subsecretaría de Planificación Sanitaria  
Ministerio de Salud, CABA

## INTRODUCCIÓN

La epidemiología en la gestión tiene como uno de los pilares la recolección, sistematización y análisis de los datos de diferentes fuentes en forma sistemática, periódica y oportuna, para convertirlos en información integrada con el fin de divulgarlos y que esta información permita generar acciones por parte diferentes actores y actrices involucrados en el concierto de la Salud.

El presente boletín es un producto completamente dinámico que pretende cumplir con varios objetivos, entre ellos, hay dos primordiales.

El primero es devolver, consolidada y sistematizada, la información mínima vertida por los servicios a través de los diferentes sistemas de información.

Junto con la retroalimentación del sistema, el objetivo primario del BES es dar cuenta de la situación epidemiológica actual. En especial, esto se realiza a través de los eventos de notificación obligatoria por medio de tablas y gráficos y de eventos seleccionados por su importancia estacional o de gestión.

A lo anterior, se incorporan otras fuentes de datos, consolidados y análisis especiales que pretenden dar cuenta de la situación epidemiológica.

Este boletín es posible gracias al compromiso de los efectores de salud públicos y privados que se involucran en la tarea de vigilancia. El equipo de la gerencia agradece los trabajos remitidos para ser difundidos a través de esta publicación e invita a continuar el envío de los mismos para su divulgación y enriquecimiento de los BES.

## RESUMEN EJECUTIVO

Se exponen los datos comparativos hasta la semana epidemiológica (SE) 45 de los años 2022 y 2023 por grupo de eventos nominales y agrupados de notificación obligatoria.

Se incluye un informe sobre la vigilancia de las enfermedades respiratorias hasta la SE 45.

Se presenta el informe de inicio de temporada de dengue 2023-2024 hasta la SE 47.

## I. Reporte de enfermedades en la Ciudad de Buenos Aires

En las siguientes tablas se presentan el total de las notificaciones nominales y agrupadas, provenientes de la integración de los módulos C2 y SIVILA del SNVS hasta el 28 de abril de 2018 y a partir de esa fecha, el SNVS<sup>2.0</sup>, correspondientes a residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las mismas son cotejadas caso por caso, para evitar la presencia de notificaciones duplicadas y lograr la obtención de una base consolidada aprovechando los atributos de los dos módulos.

Las siguientes tablas se conforman con las notificaciones que contienen datos de domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto con los casos donde no figura esta referencia. Por lo tanto, dependiendo el evento, la información puede contener sesgos, para lo cual la GOE está trabajando continuamente para la mejora de la calidad de los datos.

La información que se presenta a continuación es la acumulada hasta la **SE 45** del corriente año (finalizada el 11 de noviembre) y se compara con el mismo período del año 2022 mostrando el aumento o descenso en las columnas “diferencia de casos” -donde se presenta la diferencia absoluta entre un año y el otro (por ser menos de 20 casos)- y “variación porcentual” (para los eventos como más de 20 casos).

Tabla 1. Notificaciones de casos acumulados agrupados hasta la SE 45. Residentes de CABA.  
Comparación 2022-2023

| Notificaciones de casos acumulados agrupados hasta la SE 45 en Residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires |                                              |      |      |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|---------------|-------------|
| Grupo de eventos                                                                                                | Evento                                       | 2022 | 2023 | Dif. de casos | Variación % |
| De transmisión sexual                                                                                           | Secreción genital en mujeres                 | 881  | 583  |               | -34         |
|                                                                                                                 | Secreción genital purulenta en varones       | 35   | 65   |               | 86          |
|                                                                                                                 | Secreción genital sin especificar en varones | 53   | 47   |               | -11         |
|                                                                                                                 | Sífilis sin especificar en mujeres (ITS)     | 235  | 250  |               | 6           |
|                                                                                                                 | Sífilis sin especificar en varones (ITS)     | 297  | 309  |               | 4           |
|                                                                                                                 | Sífilis temprana en mujeres                  | 37   | 63   |               | 70          |
|                                                                                                                 | Sífilis Temprana en varones                  | 84   | 121  |               | 44          |
| Gastroentéricas                                                                                                 | Diarreas                                     | 8264 | 9606 |               | 16          |
| Inmunoprevenibles                                                                                               | Parotiditis                                  | 178  | 129  |               | -28         |
|                                                                                                                 | Varicela                                     | 336  | 329  |               | -2          |
| Internaciones por lesiones en el hogar*                                                                         | Lesiones en el hogar sin especificar         | 0    | 7    | 7             |             |
|                                                                                                                 | Lesiones por caídas y golpes                 | 0    | 74   | 74            |             |
|                                                                                                                 | Lesiones por cortes y quemaduras             | 0    | 9    | 9             |             |
|                                                                                                                 | Otras lesiones en el hogar                   | 0    | 1    | 1             |             |
| Internaciones por siniestros viales*                                                                            | Conductor o pasajero de automovil            | 0    | 11   | 11            |             |
|                                                                                                                 | Conductor o pasajero de motocicleta          | 0    | 14   | 14            |             |
|                                                                                                                 | Peatón                                       | 0    | 5    | 5             |             |
|                                                                                                                 | Ciclista                                     | 0    | 1    | 1             |             |
| Lesiones por mordedura de perro (ambulatorios)*                                                                 | Perro conocido en la vía pública             | 0    | 135  | 135           |             |
|                                                                                                                 | Perro desconocido en la vía pública          | 0    | 97   | 97            |             |
|                                                                                                                 | Perro en la vivienda                         | 0    | 213  | 213           |             |
|                                                                                                                 | Perro sin especificar                        | 0    | 129  | 129           |             |

\* En el 2022 no se presentan casos de estos grupos de eventos ya que no formaban parte de los ENOs.

Fuente: SNVS 2.0

Tabla 2. Notificaciones de casos acumulados nominales hasta la SE 45. Residentes de CABA.  
Comparación 2022-2023

| Notificaciones de casos acumulados hasta la SE 45 en Residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires |                                                    |      |      |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|---------------|-------------|
| Grupo de eventos                                                                                      | Evento                                             | 2022 | 2023 | Dif. de casos | Variación % |
| De transmisión vertical                                                                               | CHAGAS AGUDO CONGÉNITO                             | 109  | 93   |               | -15         |
|                                                                                                       | CHAGAS CRÓNICO EN EMBARAZADAS                      | 99   | 49   |               | -51         |
|                                                                                                       | SÍFILIS CONGÉNITA                                  | 92   | 52   |               | -43         |
|                                                                                                       | SÍFILIS EN EMBARAZADA                              | 244  | 243  |               | 0           |
| Envenenamiento por animal ponzoñoso                                                                   | ALACRANISMO                                        | 7    | 11   | 4             |             |
|                                                                                                       | ARANEISMO                                          | 1    | 3    | 2             |             |
|                                                                                                       | OFIDISMO                                           | 3    | 1    | -2            |             |
| Hepatitis                                                                                             | HEPATITIS A                                        | 20   | 9    | -11           |             |
|                                                                                                       | HEPATITIS B                                        | 117  | 61   |               | -48         |
|                                                                                                       | HEPATITIS B EN BANCOS DE SANGRE                    | 85   | 51   |               | -40         |
|                                                                                                       | HEPATITIS C                                        | 129  | 128  |               | -1          |
|                                                                                                       | HEPATITIS C EN BANCOS DE SANGRE                    | 22   | 20   | -2            |             |
|                                                                                                       | HEPATITIS AGUDA GRAVE DE ORIGEN DESCONOCIDO        | 5    | 1    | -4            |             |
|                                                                                                       | INFECCIONES INVASIVAS POR Haemophilus influenzae   | 10   | 5    | -5            |             |
| Infecciones invasivas                                                                                 | INFECCIONES INVASIVAS POR Neisseria Meningitidis   | 2    | 1    | -1            |             |
|                                                                                                       | INFECCIONES INVASIVAS POR OTROS AGENTES            | 3    | 20   | 17            |             |
|                                                                                                       | INFECCIONES INVASIVAS POR Streptococcus pneumoniae | 5    | 32   | 27            |             |
|                                                                                                       | INFECCIONES INVASIVAS POR Streptococco Pyogenes    | 6    | 64   | 58            |             |
| Inmunoprevenibles                                                                                     | COQUELUCE                                          | 33   | 19   | -14           |             |
|                                                                                                       | DIFTERIA                                           | 0    | 0    | 0             |             |
|                                                                                                       | EFE (SARAMPIÓN-RUBEOLA)                            | 76   | 17   | -59           |             |
|                                                                                                       | PAF                                                | 7    | 3    | -4            |             |
|                                                                                                       | PAROTIDITIS                                        | 17   | 32   | 15            |             |
| Intoxicaciones                                                                                        | MEDICAMENTOSA                                      | 2    | 11   | 9             |             |
|                                                                                                       | POR METALES PESADOS                                | 14   | 0    | -14           |             |
|                                                                                                       | POR MONÓXIDO DE CARBONO                            | 51   | 60   |               | 18          |
|                                                                                                       | POR OTROS TÓXICOS                                  | 2    | 1    | -1            |             |
|                                                                                                       | POR PLAGUICIDAS                                    | 0    | 0    | 0             |             |
|                                                                                                       | POR PLAGUICIDAS DE USO DOMÉSTICO                   | 0    | 0    | 0             |             |

Nota: La información de la tabla es parcial y sujeta a modificaciones; se incluyen casos notificados con lugar de residencia en la CABA que pueden haber presentado antecedente de viaje.

Fuente: SNVS 2.0

## Notificaciones de casos acumulados hasta la SE 45 en Residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

| Grupo de eventos                                          | Evento                                 | 2022 | 2023  | Dif. de casos | Variación % |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------|---------------|-------------|
| <b>Lesiones intencionales</b>                             | INTENTOS DE SUICIDIO                   | 0    | 49    | 49            |             |
| <b>Lesiones no intencionales</b>                          | LESIONES GRAVES POR MORDEDURA DE PERRO | 0    | 3     | 3             |             |
|                                                           | POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE             | 3    | 0     | -3            |             |
| <b>Meningitis y Meningoencefalitis</b>                    | BACTERIANA POR OTROS AGENTES           | 1    | 6     | 5             |             |
|                                                           | BACTERIANA SIN ESPECIFICAR AGENTE      | 2    | 4     | 2             |             |
|                                                           | OTROS GERMESES NO BACT. NI VIRALES     | 0    | 1     | 1             |             |
|                                                           | TUBERCULOSA                            | 5    | 0     | -5            |             |
|                                                           | POR OTROS VIRUS                        | 1    | 2     | 1             |             |
|                                                           | POR STREPTOCOCCO NEUMONIAE             | 13   | 9     | -4            |             |
|                                                           | SIN ESPECIFICAR ETIOLOGIA              | 29   | 22    | -7            |             |
|                                                           | MICOTICAS Y PARASITARIAS               | 2    | 4     | 2             |             |
|                                                           | VIRALES POR ENTEROVIRUS                | 2    | 2     | 0             |             |
|                                                           | VIRALES POR OTROS AGENTES              | 1    | 3     | 2             |             |
|                                                           | VIRALES SIN ESPECIFICAR AGENTES        | 4    | 5     | 1             |             |
|                                                           | VIRALES URLEANAS                       | 0    | 0     | 0             |             |
|                                                           | POR NEISSERIA MENINGITIDIS             | 0    | 5     | 5             |             |
|                                                           | TUBERCULOSA < 5 AÑOS                   | 0    | 0     | 0             |             |
| <b>Transmitidas por alimentos, agua o ruta fecal-oral</b> | BOTULISMO                              | 4    | 0     | -4            |             |
|                                                           | BOTULISMO DEL LACTANTE                 | 0    | 1     | 1             |             |
|                                                           | DIARREAS AGUDAS SANGUINOLIENTAS        | 196  | 162   |               | -17         |
|                                                           | DIARREAS BACTERIANAS                   | 105  | 95    |               | -10         |
|                                                           | DIARREAS VIRALES                       | 13   | 5     | -8            |             |
|                                                           | FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA         | 9    | 7     | -2            |             |
|                                                           | LISTERIOSIS                            | 0    | 2     | 2             |             |
|                                                           | SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO (SUH)      | 15   | 1     | -14           |             |
|                                                           | TRIQUINOSIS                            | 1    | 2     | 1             |             |
| <b>Tuberculosis y lepra</b>                               | LEPRA                                  | 3    | 2     | -1            |             |
|                                                           | TUBERCULOSIS                           | 1283 | 1247  |               | -3          |
| <b>Zoonóticas y por vectores</b>                          | BRUCELOSIS                             | 10   | 5     | -5            |             |
|                                                           | DENGUE                                 | 170  | 21281 |               | 12418       |
|                                                           | ZIKA (TODOS LOS EVENTOS)               | 0    | 0     |               |             |
|                                                           | FIEBRE CHIKUNGUNYA                     | 0    | 231   | 231           |             |
|                                                           | FIEBRE AMARILLA                        | 2    | 1     | -1            |             |
|                                                           | FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL             | 1    | 2     | 1             |             |
|                                                           | FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA           | 2    | 1     |               |             |
|                                                           | HANTAVIROSI                            | 14   | 22    | 8             |             |
|                                                           | PSITACOSIS                             | 6    | 13    | 7             |             |
|                                                           | LEISHMANIASIS CUTÁNEA                  | 1    | 2     | 1             |             |
|                                                           | LEISHMANIASIS VISCERAL                 | 4    | 2     | -2            |             |
|                                                           | LEPTOSPIROSIS                          | 26   | 16    | -10           |             |
|                                                           | PALUDISMO                              | 6    | 9     | 3             |             |
|                                                           | RICKETTSIOSIS                          | 7    | 1     | -6            |             |
|                                                           | VIRUS DE LA ENCEFALITIS DE SAN LUIS    | 1    | 4     | 3             |             |
|                                                           | VIRUELA SÍMICA                         | 738  | 128   |               | -83         |

Nota: La información de la tabla es parcial y sujeta a modificaciones; se incluyen casos notificados con lugar de residencia en la CABA que pueden haber presentado antecedente de viaje.

Fuente: SNVS 2.0

## I.1. DETALLE DE LA NOTIFICACIÓN POR GRUPO DE EVENTOS

Las tablas que se exponen a continuación corresponden al detalle de la Consolidada por Grupo de Eventos ([ítem I](#)), presentando los datos ampliados según el criterio epidemiológico de clasificación del caso. Por lo tanto, las especificaciones de metodología son las descritas anteriormente.

En todos los casos, las referencias son: C=confirmado; P=probable; S=sospechoso; D=descartado.

### I.1.A. De transmisión vertical y sexual

| GRUPO DE EVENTO         | EVENTO                        | 2022 |   |    |    |       | 2023 |   |    |   |       | DIF. DE CASOS | VAR. % |
|-------------------------|-------------------------------|------|---|----|----|-------|------|---|----|---|-------|---------------|--------|
|                         |                               | C    | P | S  | D  | TOTAL | C    | P | S  | D | TOTAL |               |        |
| De transmisión vertical | CHAGAS AGUDO CONGÉNITO        | 11   | 0 | 53 | 45 | 109   | 3    | 0 | 81 | 9 | 93    |               | 15     |
|                         | CHAGAS CRÓNICO EN EMBARAZADAS | 99   | 0 | 0  | 0  | 99    | 49   | 0 | 0  | 0 | 49    |               | -51    |
|                         | SÍFILIS CONGÉNITA             | 64   | 0 | 5  | 23 | 92    | 52   | 0 | 0  | 0 | 52    |               | -43    |
|                         | SÍFILIS EN EMBARAZADA         | 244  | 0 | 0  | 0  | 244   | 243  | 0 | 0  | 0 | 243   |               | 0      |

### I.1.B. Envenenamiento por animal ponzoñoso

| GRUPO DE EVENTO                     | EVENTO      | 2022 |   |   |   |       | 2023 |   |   |   |       | DIF. DE CASOS | VAR. % |
|-------------------------------------|-------------|------|---|---|---|-------|------|---|---|---|-------|---------------|--------|
|                                     |             | C    | P | S | D | TOTAL | C    | P | S | D | TOTAL |               |        |
| Envenenamiento por animal ponzoñoso | ALACRANISMO | 7    | 0 | 0 | 0 | 7     | 7    | 0 | 4 | 0 | 11    |               | 4      |
|                                     | ARANEISMO   | 0    | 0 | 1 | 0 | 1     | 2    | 0 | 1 | 0 | 3     |               | 2      |
|                                     | OFIDISMO    | 3    | 0 | 0 | 0 | 3     | 1    | 0 | 0 | 0 | 1     |               | -2     |

\* Los casos confirmados de Ofidismo corresponden a cuatro residentes de CABA: tres con antecedente de viaje a Córdoba y Entre Ríos y uno trabajador de áreas protegidas.

### I.1.C. Hepatitis

| GRUPO DE EVENTO | EVENTO                                      | 2022 |    |    |    |       | 2023 |    |    |   |       | DIF. DE CASOS | VAR. % |
|-----------------|---------------------------------------------|------|----|----|----|-------|------|----|----|---|-------|---------------|--------|
|                 |                                             | C    | P  | S  | D  | TOTAL | C    | P  | S  | D | TOTAL |               |        |
| Hepatitis       | HEPATITIS A                                 | 16   | 0  | 1  | 3  | 20    | 7    | 0  | 1  | 1 | 9     |               | -11    |
|                 | HEPATITIS B                                 | 83   | 11 | 20 | 3  | 117   | 43   | 5  | 13 | 0 | 61    |               | -48    |
|                 | HEPATITIS B EN BANCOS DE SANGRE             | 0    | 25 | 60 | 0  | 85    | 0    | 11 | 40 | 0 | 51    |               | -40    |
|                 | HEPATITIS C                                 | 47   | 37 | 24 | 21 | 129   | 93   | 16 | 18 | 1 | 128   |               | -1     |
|                 | HEPATITIS C EN BANCOS DE SANGRE             | 0    | 4  | 18 | 0  | 22    | 0    | 2  | 18 | 0 | 20    |               | -2     |
|                 | HEPATITIS AGUDA GRAVE DE ORIGEN DESCONOCIDO | 0    | 1  | 3  | 1  | 5     | 0    | 0  | 1  | 0 | 1     |               | -4     |

### I.1.D. Infecciones invasivas

| GRUPO DE EVENTO       | EVENTO                                                    | 2022 |   |   |   |       | 2023 |   |   |   |       | DIF. DE CASOS | VAR. % |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------|---|---|---|-------|------|---|---|---|-------|---------------|--------|
|                       |                                                           | C    | P | S | D | TOTAL | C    | P | S | D | TOTAL |               |        |
| Infecciones invasivas | INFECCIONES INVASIVAS POR <i>Haemophilus influenzae</i>   | 9    | 1 | 0 | 0 | 10    | 5    | 0 | 0 | 0 | 5     |               | -5     |
|                       | INFECCIONES INVASIVAS POR <i>Neisseria Meningitidis</i>   | 2    | 0 | 0 | 0 | 2     | 1    | 0 | 0 | 0 | 1     |               | -1     |
|                       | INFECCIONES INVASIVAS POR OTROS AGENTES                   | 2    | 0 | 1 | 0 | 3     | 17   | 1 | 2 | 0 | 20    |               | 17     |
|                       | INFECCIONES INVASIVAS POR <i>Streptococcus pneumoniae</i> | 5    | 0 | 0 | 0 | 5     | 32   | 0 | 0 | 0 | 32    |               | 27     |
|                       | INFECCIONES INVASIVAS POR <i>Streptococcus Pyogenes</i>   | 6    | 0 | 0 | 0 | 6     | 64   | 0 | 0 | 0 | 64    |               | 58     |

### I.1.E. Inmunoprevenibles

| GRUPO DE EVENTO   | EVENTO                  | 2022 |   |    |    |       | 2023 |   |    |    |       | DIF. DE CASOS | VAR. % |
|-------------------|-------------------------|------|---|----|----|-------|------|---|----|----|-------|---------------|--------|
|                   |                         | C    | P | S  | D  | TOTAL | C    | P | S  | D  | TOTAL |               |        |
| Inmunoprevenibles | COQUELUCE               | 0    | 2 | 2  | 29 | 33    | 3    | 1 | 2  | 13 | 19    |               | -14    |
|                   | DIFTERIA                | 0    | 0 | 0  | 0  | 0     | 0    | 0 | 0  | 0  | 0     |               | 0      |
|                   | EFE (SARAMPIÓN-RUBEOLA) | 1    | 0 | 0  | 75 | 76    | 0    | 0 | 4  | 13 | 17    |               | -59    |
|                   | PAF                     | 0    | 0 | 0  | 7  | 7     | 0    | 0 | 3  | 0  | 3     |               | -4     |
|                   | PAROTIDITIS             | 5    | 0 | 12 | 0  | 17    | 21   | 0 | 11 | 0  | 32    |               | 15     |

### I.1.F. Intoxicaciones

| GRUPO DE EVENTO | EVENTO                           | 2022 |   |    |    |       | 2023 |   |   |   |       | DIF. DE CASOS | VAR. % |
|-----------------|----------------------------------|------|---|----|----|-------|------|---|---|---|-------|---------------|--------|
|                 |                                  | C    | P | S  | D  | TOTAL | C    | P | S | D | TOTAL |               |        |
| Intoxicaciones  | MEDICAMENTOSA                    | 2    | 0 | 0  | 0  | 2     | 7    | 0 | 4 | 0 | 11    |               | 9      |
|                 | POR METALES PESADOS              | 2    | 1 | 1  | 10 | 14    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     |               | -14    |
|                 | POR MONÓXIDO DE CARBONO          | 37   | 0 | 14 | 0  | 51    | 51   | 0 | 9 | 0 | 60    |               | 18     |
|                 | POR OTROS TÓXICOS                | 2    | 0 | 0  | 0  | 2     | 1    | 0 | 0 | 0 | 1     |               | -1     |
|                 | POR PLAGUICIDAS                  | 0    | 0 | 0  | 0  | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     |               | 0      |
|                 | POR PLAGUICIDAS DE USO DOMÉSTICO | 0    | 0 | 0  | 0  | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0     |               | 0      |

## I.1.G. Lesiones intencionales

| GRUPO DE EVENTO | EVENTO | 2022 |   |   |   |       | 2023 |   |   |   |       | DIF. DE CASOS |
|-----------------|--------|------|---|---|---|-------|------|---|---|---|-------|---------------|
|                 |        | C    | P | S | D | TOTAL | C    | P | S | D | TOTAL |               |

Lesiones intencionales INTENTOS DE SUICIDIO

0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 49 49

\* En el 2022 no se presentan casos de estos grupos de eventos ya que no formaban parte de los ENOs.

De la totalidad de los casos confirmados solo uno corresponde a intentos de suicidio con resultado mortal

## I.1.H. Lesiones no intencionales

| GRUPO DE EVENTO | EVENTO | 2022 |   |   |   |       | 2023 |   |   |   |       | DIF. DE CASOS |
|-----------------|--------|------|---|---|---|-------|------|---|---|---|-------|---------------|
|                 |        | C    | P | S | D | TOTAL | C    | P | S | D | TOTAL |               |

Lesiones no intencionales LESIONES GRAVES POR MORDEDURA DE PERRO

0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3

\* En el 2022 no se presentan casos de estos grupos de eventos ya que no formaban parte de los ENOs.

## I.1.I. Meningitis y meningoencefalitis

| GRUPO DE EVENTO | EVENTO | 2022 |   |   |   |       | 2023 |   |   |   |       | DIF. DE CASOS |
|-----------------|--------|------|---|---|---|-------|------|---|---|---|-------|---------------|
|                 |        | C    | P | S | D | TOTAL | C    | P | S | D | TOTAL |               |

|                                 |                                    |    |   |    |   |    |   |   |   |   |    |    |
|---------------------------------|------------------------------------|----|---|----|---|----|---|---|---|---|----|----|
| Meningitis y meningoencefalitis | POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE         | 3  | 0 | 0  | 0 | 3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | -3 |
|                                 | BACTERIANA POR OTROS AGENTES       | 0  | 0 | 1  | 0 | 1  | 5 | 1 | 0 | 0 | 6  | 5  |
|                                 | BACTERIANA SIN ESPECIFICAR AGENTE  | 0  | 0 | 2  | 0 | 2  | 1 | 3 | 0 | 0 | 4  | 2  |
|                                 | OTROS GERMESES NO BACT. NI VIRALES | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1  | 1  |
|                                 | TUBERCULOSA                        | 4  | 0 | 0  | 1 | 5  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | -5 |
|                                 | POR OTROS VIRUS                    | 1  | 0 | 0  | 0 | 1  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2  | 1  |
|                                 | POR STREPTOCOCCO NEUMONIAE         | 13 | 0 | 0  | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9  | -4 |
|                                 | SIN ESPECIFICAR ETIOLOGIA          | 5  | 0 | 17 | 7 | 29 | 9 | 5 | 7 | 1 | 22 | -7 |
|                                 | MICOTICAS Y PARASITARIAS           | 2  | 0 | 0  | 0 | 2  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4  | 2  |
|                                 | VIRALES POR ENTEROVIRUS            | 2  | 0 | 0  | 0 | 2  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2  | 0  |
|                                 | VIRALES POR OTROS AGENTES          | 0  | 0 | 1  | 0 | 1  | 1 | 2 | 0 | 0 | 3  | 2  |
|                                 | VIRALES SIN ESPECIFICAR AGENTES    | 0  | 0 | 4  | 0 | 4  | 4 | 1 | 0 | 0 | 5  | 1  |
|                                 | VIRALES URLEANAS                   | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
|                                 | POR NEISSERIA MENINGITIDIS         | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5  | 5  |
|                                 | TUBERCULOSA < 5 AÑOS               | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |

## I.1.J. Transmitidas por alimentos, agua o ruta fecal-oral

| GRUPO DE EVENTO | EVENTO | 2022 |   |   |   |       | 2023 |   |   |   |       | DIF. DE CASOS | VAR. % |
|-----------------|--------|------|---|---|---|-------|------|---|---|---|-------|---------------|--------|
|                 |        | C    | P | S | D | TOTAL | C    | P | S | D | TOTAL |               |        |

|                                                    |                                   |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|---|---|---|-----|-----|---|---|---|-----|-----|--|
| Transmitidas por alimentos, agua o ruta fecal-oral | BOTULISMO                         | 2   | 0 | 1 | 1 | 4   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | -4  |  |
|                                                    | BOTULISMO DEL LACTANTE            | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 1   | 0 | 0 | 0 | 1   | 1   |  |
|                                                    | DIARREAS AGUDAS SANGUINOLIENTAS   | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | -17 |  |
|                                                    | DIARREAS BACTERIANAS              | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 95  | 0 | 0 | 0 | 95  | -10 |  |
|                                                    | DIARREAS VIRALES                  | 13  | 0 | 0 | 0 | 13  | 5   | 0 | 0 | 0 | 5   | -8  |  |
|                                                    | FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA    | 9   | 0 | 0 | 0 | 9   | 4   | 1 | 2 | 0 | 7   | -2  |  |
|                                                    | LISTERIOSIS                       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 2   | 0 | 0 | 0 | 2   | 2   |  |
|                                                    | SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO (SUH) | 15  | 0 | 0 | 0 | 15  | 11  | 0 | 0 | 0 | 11  | -4  |  |
|                                                    | TRIQUINOSIS                       | 0   | 0 | 1 | 0 | 1   | 1   | 0 | 1 | 0 | 2   | 1   |  |

## I.1.K. Tuberculosis y lepra

| GRUPO DE EVENTO | EVENTO | 2022 |   |   |   |       | 2023 |   |   |   |       | DIF. DE CASOS | VAR. % |
|-----------------|--------|------|---|---|---|-------|------|---|---|---|-------|---------------|--------|
|                 |        | C    | P | S | D | TOTAL | C    | P | S | D | TOTAL |               |        |

|                      |              |      |   |   |   |      |      |   |   |   |      |    |  |
|----------------------|--------------|------|---|---|---|------|------|---|---|---|------|----|--|
| Tuberculosis y lepra | LEPRA        | 3    | 0 | 0 | 0 | 3    | 1    | 0 | 1 | 0 | 2    | -1 |  |
|                      | TUBERCULOSIS | 1283 | 0 | 0 | 0 | 1283 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 1247 | -3 |  |

## I.1.L. Zoonóticas y por vectores

| GRUPO DE EVENTO | EVENTO | 2022 |   |   |   |       | 2023 |   |   |   |       | DIF. DE CASOS | VAR. % |
|-----------------|--------|------|---|---|---|-------|------|---|---|---|-------|---------------|--------|
|                 |        | C    | P | S | D | TOTAL | C    | P | S | D | TOTAL |               |        |

|                           |                                     |     |   |   |     |     |       |      |      |      |       |       |  |
|---------------------------|-------------------------------------|-----|---|---|-----|-----|-------|------|------|------|-------|-------|--|
| Zoonóticas y por vectores | BRUCELOSIS                          | 3   | 1 | 2 | 4   | 10  | 2     | 1    | 2    | 0    | 5     | -5    |  |
|                           | DENGUE                              | 6   | 3 | 9 | 152 | 170 | 12252 | 1478 | 6349 | 1202 | 21281 | 12418 |  |
|                           | ZIKA (TODOS LOS EVENTOS)            | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     |  |
|                           | FIEBRE CHIKUNGUNYA                  | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   | 151   | 15   | 57   | 8    | 231   | 231   |  |
|                           | FIEBRE AMARILLA                     | 0   | 0 | 0 | 2   | 2   | 0     | 0    | 1    | 0    | 1     | -1    |  |
|                           | FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL          | 0   | 0 | 0 | 1   | 1   | 1     | 0    | 0    | 1    | 2     | 1     |  |
|                           | FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA        | 1   | 0 | 1 | 0   | 2   | 0     | 0    | 0    | 1    | 1     | -1    |  |
|                           | HANTAVIROSIS                        | 1   | 0 | 0 | 13  | 14  | 0     | 0    | 2    | 20   | 22    | 8     |  |
|                           | PSITACOSIS                          | 2   | 0 | 4 | 0   | 6   | 7     | 1    | 2    | 3    | 13    | 7     |  |
|                           | LEISHMANIASIS CUTÁNEA               | 0   | 0 | 1 | 0   | 1   | 2     | 0    | 0    | 0    | 2     | 1     |  |
|                           | LEISHMANIASIS VISCERAL              | 0   | 1 | 1 | 2   | 4   | 0     | 0    | 1    | 1    | 2     | -2    |  |
|                           | LEPTOSPIROSIS                       | 1   | 0 | 4 | 21  | 26  | 1     | 0    | 4    | 11   | 16    | -10   |  |
|                           | PALUDISMO                           | 2   | 0 | 4 | 0   | 6   | 7     | 0    | 0    | 2    | 9     | 3     |  |
|                           | RICKETTSIOSIS                       | 2   | 0 | 2 | 3   | 7   | 0     | 0    | 1    | 0    | 1     | -6    |  |
|                           | VIRUS DE LA ENCEFALITIS DE SAN LUIS | 0   | 0 | 0 | 1   | 1   | 1     | 0    | 1    | 2    | 4     | 3     |  |
|                           | VIRUELA SÍMICA                      | 528 | 0 | 8 | 202 | 738 | 43    | 0    | 14   | 71   | 128   | -83   |  |

## II. Vigilancia de Enfermedades respiratorias

### II.1. INTRODUCCIÓN

#### II.1.A. Nota metodológica

Los datos provienen de la notificación oficial realizada al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS), donde hasta el 28 de abril de 2018 se analiza por la integración de los módulos C2 y SIVILA y a partir de esa fecha del SNVS<sup>2.0</sup>.

Para los informes se analizan las notificaciones realizadas por efectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

#### II.1.B. Sobre el informe de IRA

A continuación, se presentará de manera breve la situación de las Infecciones respiratorias agudas, en particular aquellas notificaciones correspondientes a la vigilancia de laboratorio que han sido realizadas de manera agrupada, hasta la Semana Epidemiológica (SE) actual según los datos de la notificación en el SNVS<sup>2.0</sup> y las notificaciones nominales de eventos seleccionados.

### II.2. SITUACIÓN NACIONAL<sup>1</sup>

#### II.2.A. Vigilancia clínica

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional con información reportada hasta la semana epidemiológica 44, entre la SE 1-44 del año 2023 se notificaron en el componente de Vigilancia Clínica del SNVS 206.896 casos de Bronquiolitis, con una tasa de incidencia acumulada de 14.181,4 casos/100.000 habitantes.

Con respecto al evento Neumonía, entre la SE 01-44 del año 2023 se notificaron en el componente de Vigilancia Clínica del SNVS 158.402 casos de Neumonía, con una incidencia acumulada de 339,5 casos/100.000 habitantes.

Con respecto al número de notificaciones de neumonías en las semanas 1 a 44 del período 2014-2023, se observa que el año con mayor número de notificaciones fue 2016, seguido por 2022 y 2017. En la presente temporada el número de casos registrados es menor en relación con la mayoría de los años incluidos en el periodo, a excepción de 2014 y 2018-2020.

Entre la SE 1-44 del año 2023 se notificaron en el componente de Vigilancia Clínica del SNVS 977.608 casos de ETI, con una tasa de incidencia acumulada de 2095,4 casos/100.000 habitantes.

<sup>1</sup><https://bancos.salud.gob.ar/recurso/boletin-epidemiologico-nacional-n-678-se-45-2023>

Para el evento COVID-19, los casos acumulados del 2023 hasta la SE 45 se encuentran por debajo del año 2021 y 2022 para el mismo período. Lo mismo ocurre con los fallecidos. A partir de la SE 30, se observa un aumento de número de casos con un promedio de 3084 casos y 21 fallecidos. En las últimas 10 semanas se observa un descenso del número semanal de casos.

### **II.2.B. Vigilancia de virus respiratorios en unidades de monitoreo de pacientes ambulatorios (UMAS)**

Con respecto a la estrategia de vigilancia de las UMAs, entre la SE 16/2022 y la 45/2023 el porcentaje de positividad entre las muestras analizadas por rt-PCR es de 18,28%, 17,27% y 3,44% para SARS-CoV-2, Influenza y VSR respectivamente.

En cuanto a las Influenza, la distribución de las mismas fue similar tanto para Influenza A y B. Respecto a las Influenza A que fueron suptipificadas, el 51,36% correspondieron al H1N1. En cambio, para el 97,6% de las Influenza B no se pudo obtener el linaje.

### **II.2.C. Vigilancia de virus respiratorios en pacientes internados**

En cuanto a casos acumulados entre la SE 23/2022 y la SE 45/2023, el porcentaje de positividad para SARS-CoV-2 en pacientes hospitalizados fue de 11,36%. Con respecto a las Influenza, el 15,26% de las muestras resultaron positivas predominando las Influenza A (H1N1 pdm09).


Para el mismo período el porcentaje de positividad para VSR es de 31,02% el cual presentó un aumento entre las SE 13 y 21 para luego presentar un descenso.

## **II.3.SITUACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. AÑOS 2019-2023**

### **II.3.A. Vigilancia de laboratorio agrupada años 2019-2023**

En el siguiente gráfico se presenta la distribución de muestras positivas según año y tipo de virus hasta la SE 45 de 2023.


**Gráfico 1. Muestras positivas según virus y porcentaje de positividad.**  
Año 2019 n= 6744; Año 2020 n= 654; Año 2021 n=4122; Año 2022 n= 11404, Año 2023 (h SE 45) n=8318



Fuente: SNVS<sup>2.0</sup>

Como se puede observar, la aparición de aislamientos de VSR se adelantó un par de semanas con respecto a los años anteriores.

**Gráfico 2. Circulación Viral Global. Distribución porcentual de determinaciones de SE 1-45**  
Año 2019 n= 6555; Año 2020 n=586; Año 2021 n=4027; Año 2022 n= 10738, Año 2023 n=8318.



Fuente: SNVS<sup>2.0</sup>


Se puede observar en el gráfico comparando los años desde la SE 1-45, el predominio del Virus Sincial Respiratorio (VSR) en los años 2019, 2021 y 2023 mientras

que en 2020 se verifica una mayor proporción de Adenovirus. Durante el año 2022, se registró una proporción igual de Influenza A y Metapneumovirus.

Hasta la SE 45 del corriente año, se observa una mayor circulación de Virus Sincial con un 51,9% de muestras positivas, seguido por la Influenza A con un 16,8%.

A continuación, se presenta el total de las muestras estudiadas y positivas a virus respiratorios para el año 2023 hasta la SE 45.

**Gráfico 3.** Circulación Viral Global. Distribución porcentual de determinaciones.  
Año 2023. Hasta SE 45. n=188.107. CABA




Fuente: SNVS<sup>2.0</sup>

Hasta la SE en análisis, se estudiaron 188.107 muestras donde el 4,4% (8318) resultaron positivas.

A continuación, se representan la distribución de las muestras positivas según virus por semana epidemiológica.

**Gráfico 4. Circulación Viral Global por semana epidemiológica. Año 2023.**  
Hasta SE 45. n=8318. CABA




Fuente: SNVS<sup>2.0</sup>

Como se ve en el gráfico, durante las SE 1 a la 12 el Adenovirus era predominante en las muestras testeadas, viendo que a partir de la SE 13 el VSR predomina en las muestras analizadas. A partir de la SE 17 la Influenza A comienza a ser detectada, teniendo en las SE subsiguientes un crecimiento. Se registra un leve aumento de Metapneumovirus en la semana 28 y 31.

En los siguientes gráficos se exponen la circulación global y absoluto de los virus según grupo etario para el año en curso.

**Gráfico 5. Circulación Viral - Distribución de determinaciones según grupo etario.**  
Año 2023. Hasta SE 45. n=7925\*. CABA



Fuente: SNVS<sup>2.0</sup>\* Se excluye la categoría "Sin especificar edad"

En el gráfico anterior se observa que el VSR es predominante en los menores de 10 años. Para los grupos etarios comprendidos entre los 20 a 74 años, la Influenza A es el mayor aislamiento.

En la siguiente tabla se presentan el número de muestras estudiadas y su correspondiente porcentaje de positividad según efector público de notificación.

**Tabla 3.** Número de muestras y porcentaje de positividad según efector público de notificación.  
Año 2023. Hasta SE 45. CABA

| Establecimiento de notificación | Total población |               |
|---------------------------------|-----------------|---------------|
|                                 | Estudiadas      | % positividad |
| GARRAHAN                        | 71453           | 4,7%          |
| GUTIERREZ                       | 44854           | 5,6%          |
| MUÑIZ                           | 34045           | 2,6%          |
| ELIZALDE                        | 25127           | 3,6%          |
| DURAND                          | 11040           | 5,2%          |
| RIVADAVIA                       | 11148           | 3,9%          |
| PIROVANO                        | 6976            | 3,9%          |
| SANTOJANNI                      | 5861            | 6,6%          |
| ZUBIZARRETA                     | 4841            | 7,2%          |
| PIÑERO                          | 3565            | 5,4%          |
| ARGERICH                        | 3317            | 4,6%          |
| ALVAREZ                         | 2343            | 6,4%          |
| RAMOS MEJIA                     | 1935            | 4,5%          |
| VELEZ SANSFIELD                 | 1440            | 4,4%          |
| OTROS*                          | 1995            | 7,6%          |
| <b>Total general</b>            | <b>229940</b>   | <b>4,6%</b>   |

Fuente: SNVS<sup>2.0</sup>

\*Cinco efectores con muestras estudiadas menores a 1000

Con respecto a los efectores, se evidencia que los efectores del subsector público son aquellos que notifican mayormente al SNVS<sup>2.0</sup>.

### II.3.B. Vigilancia clínica agrupada años 2019-2023


En el siguiente apartado se analizarán los eventos notificados bajo la vigilancia agrupada clínica.

**Tabla 4.** Número de casos de eventos respiratorios. Años 2019-2023 hasta SE 45. CABA

| Evento                             | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bronquiolitis en menores de 2 años | 9059         | 1018         | 3216         | 4156         | 2034         |
| Enfermedad tipo influenza          | 18849        | 10408        | 15194        | 29514        | 9888         |
| Neumonía                           | 5303         | 3074         | 4342         | 7311         | 3942         |
| <b>Total general</b>               | <b>33211</b> | <b>14500</b> | <b>22752</b> | <b>40981</b> | <b>15864</b> |

Fuente: SNVS<sup>2.0</sup>

**Gráfico 6.** Casos de eventos respiratorios por semana epidemiológica.  
Año 2023. Hasta SE 45. n=15.864. CABA



Fuente: SNVS<sup>2.0</sup>


La notificación para las enfermedades tipo influenza (ETI) predominaron desde el inicio del año en curso, presentando un descenso desde la SE 26 con un posterior leve aumento en la SE 31.

Sin embargo, las bronquiolitis en menores de 2 años presentan un leve aumento desde la SE 19 con un pico en la SE 22 y un posterior descenso gradual.

Para el caso de las neumonías, si bien registran notificaciones a lo largo del 2023, se observa un aumento a partir de la SE 22 con un posterior descenso desde la SE 27.

Los aumentos evidenciados se condicen con la temporada invernal.

**Gráfico 7.** Distribución porcentual de eventos según grupo etario.  
Año 2023. Hasta SE 45. n=15.800\*. CABA




Fuente: SNVS<sup>2.0</sup>\* Se excluye la categoría "Sin especificar edad"

Como puede observarse dentro de las enfermedades tipo influenza (ETI) se evidencia una mayor notificación en los grupos etarios mayores de 2 años. Por el contrario, las Neumonías predominan en los mayores de 75 años.


A continuación, se presentan los corredores endémicos de los eventos analizados contruidos en base a los últimos 5 años endémicos.

**Gráfico 8.** Corredor endémico semanal de Bronquiolitis en menores de 2 años.  
Año 2023. Hasta SE 43. Residentes de la CABA




Fuente: SNVS<sup>2.0</sup>

**Gráfico 9.** Corredor endémico semanal de Neumonías. Año 2023. Hasta SE 41. Residentes de la CABA



Fuente: SNVS<sup>2.0</sup>

**Gráfico 10.** Corredor endémico semanal de Enfermedades tipo Influenza.  
Año 2023. Hasta SE 41. Residentes de la CABA




Se observa que, para las bronquiolitis y ETI, en la SE 21 se posicionaron en la zona de alarma para luego descender a una zona de seguridad. En cambio, para las neumonías, desde la SE 21 hasta la SE 33 se encontraron en zona de alarma, luego se posicionó en zona de seguridad y en esta última semana volvió a posicionarse en zona de alarma.

Cabe destacar que las notificaciones para los eventos agrupados clínicos presentan una baja en la semana analizada debido a un retraso en la notificación.

### II.3.C. Vigilancia de COVID-19, Influenza y otros virus respiratorios en personas internadas

Entre la SE 21/2022 a SE 45/2023, se notificaron en el evento de Internado y/o fallecido por COVID u OVR, 51.829 casos, siendo el 39,4% de casos residentes de CABA.

**Gráfico 11.** Distribución porcentual de notificaciones de Internados y/o fallecidos por COVID u OVR según residencia. SE 21-2022 a SE 45-2023 – n=51.341. CABA



Fuente: SNVS<sup>2.0</sup>

Teniendo en cuenta solo el año en curso hasta la SE 45, se notificaron 23.538 casos de internados, siendo el 35,9% (8467) pacientes residentes de la jurisdicción. Dentro de los residentes el 51,5% corresponde a pacientes femeninos.

De las notificaciones que corresponden a residentes de CABA en el mismo período (SE 1-45 2023), solo al 30,0% (2544) se les realizó el diagnóstico etiológico por biología molecular. Dentro de los resultados, al 47,4% (1207) se les ha diagnosticado SARS COV-2, y el 26,9% (684) VSR.


A partir de la SE 16 del 2023, se detectan los primeros casos de Influenza A H1N1 e Influenza A sin subtipificar. Hasta la SE 43, se han diagnosticado 270 casos de Influenza A sin subtipificar y 72 casos de Influenza A H1N1 en los pacientes residentes de CABA.

### II.3.D. Vigilancia de pacientes internados

En este apartado se toman en cuenta todas las notificaciones, en el evento Internado y/o fallecido por COVID o IRA, tanto de manera universal como de las Unidades Centinelas

A continuación, se presentan los aislamientos de los virus de los pacientes internados, residentes de la CABA, sin incluir SARS COV-2.

**Gráfico 12.** Casos notificados Internados con diagnóstico etiológico (sin SARS COV-2). Residentes de CABA. SE 19-2022 a SE 45 2023. n=2224.




Fuente: SNVS<sup>2.0</sup>

Como se visualiza en el gráfico, los mayores aislamientos dentro de los pacientes internados son de VSR, que además se adelanta un par de semanas en comparación de años anteriores. En las últimas semanas, se observa un marcado aumento de aislamientos de Influenza A.

En el siguiente gráfico se muestran los casos con aislamiento de SARS COV-2 en pacientes internados residentes de la Ciudad.


**Gráfico 13.** Casos Internados con diagnóstico etiológico de SARS-CoV-2. Residentes de CABA. SE 19-2022 a SE 45 2023. N=4185



Fuente: SNVS<sup>2.0</sup>

En el siguiente gráfico se representan los subtipos en los aislamientos de Influenza en internados residentes de la Ciudad.


**Gráfico 14.** Casos notificados de Influenza A y B en Internados Residentes de CABA. SE 21-2022 a SE 45 2023. n=690.



Fuente: SNVS<sup>2.0</sup>

En el siguiente gráfico se presentan los casos notificados en internación y sus tasas por rango de edad.


**Gráfico 15.** Casos y tasa de notificados (x 10.000 habitantes) en Internados Residentes de CABA. SE 1 a 45 2023. n=8456\*.



Fuente: SNVS<sup>2.0</sup> \* Se excluyen la categoría "Sin especificar edad"

A continuación, se detallan los residentes de CABA internados en UCI por grupos etarios en el corriente año.


**Gráfico 16.** Casos y tasa de notificados (x 100.000 habitantes) en Internados en UCI Residentes de CABA. SE 1 a 45 2023. n=601.



Del total de los residentes internados del año en curso (8467), el 7,1% (601 casos) requirió internación en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), correspondiendo el 53,2% a pacientes masculinos. Al 51,3% de los pacientes en UCI se ha podido realizar diagnóstico etiológico por biología molecular, correspondiendo el 31,7% a pacientes con COVID-19, seguido por el 23,3% a pacientes con VSR. Al 11,3% de los pacientes se ha detectado Influenza A sin subtipificar.

En el siguiente gráfico se presentan los casos internados y fallecidos desde la SE 1 a la 45 del corriente año.

**Gráfico 17.** Casos notificados de internados y fallecidos. Residentes de CABA SE 1 a 45 2023. n=8467.



Con respecto a la caracterización de los fallecidos, el 90,2% de los casos pertenecían al grupo etario de 60 años o más, predominando el sexo femenino.

Del total de los fallecidos, el 36,8% de los casos contaron con diagnóstico etiológico, de los cuales, el 77,1% correspondió a SARS-CoV-2 y el 16,5% a Influenza A sin subtipificar.

### **II.3.E. Vigilancia de SARS-CoV-2, influenza y otros virus respiratorios (OVR) en Unidades de Monitoreo de Ambulatorios (UMA)**


El objetivo de esta estrategia es mantener la vigilancia y monitoreo de COVID-19 en pacientes ambulatorios en todos los grupos de edad en las 24 jurisdicciones del país logrando una representatividad geográfica. Adicionalmente, entre aquellos casos que cumplen con la definición de ETI, se realiza un muestreo aleatorio o sistemático para el estudio de SARS-CoV-2, influenza y VSR por rt-PCR.

En la ciudad de Buenos Aires, durante el año 2022 funcionaron las Unidades de Monitoreo de Ambulatorios (UMA) en el Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia” y el Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez”. A partir de 2023, se incorpora a los vigentes, el Hospital de Infecciosas “Francisco Javier Muñiz”.

Desde la SE 18 del 2022 hasta la SE 45 del año en curso, se han realizado 432.664 consultas a los Unidades de Febriles, siendo 58,1% residentes de CABA. Del total de los pacientes ambulatorios, el 26,0% (65.487 casos) sospechosos de SARS-CoV-2.

Desde el comienzo de la implementación de la estrategia, SE 18 del 2022 a la SE 45 del año en curso, 2440 muestras fueron seleccionadas en el muestreo sistemático. De las mismas, el 61,7% corresponden a residentes de la jurisdicción.


**Gráfico 18.** Casos totales notificados de SARS-CoV-2 según clasificación (confirmado/ descartado) en UMAs, SE 18-2022 a SE 45 2023. N=432.664. CABA



Fuente: SNVS<sup>2.0</sup>

En el siguiente gráfico se representan los tipos de virus que se aislaron en pacientes ambulatorios seleccionados residentes de la Ciudad.

**Gráfico 19.** Casos notificados por UMA según diagnóstico. Residentes de CABA. SE 22-2022 a SE 45 2023. n=532.




Fuente: SNVS<sup>2.0</sup>

Se puede observar en el gráfico que a partir de la semana 19 comienza a detectarse casos de Influenza A, siendo predominante a partir de la SE 22. La mayor notificación para el VSR se evidencia en la SE 22.

En el siguiente gráfico se representan los subtipos en los aislamientos de Influenza en pacientes ambulatorios seleccionados residentes de la Ciudad.

**Gráfico 20.** Casos totales notificados de Influenza A y B en pacientes ambulatorios. Residentes de CABA. SE 22-2022 a SE 45 2023. N=456




Fuente: SNVS<sup>2.0</sup>

### II.3.F. Vigilancia de SARS-CoV-2, influenza y otros virus respiratorios (OVR) No UMA

En el siguiente apartado se analizarán los casos notificados bajo el evento “COVID-19, Influenza y OVR en ambulatorios (No UMAs)” con especial detención en aquellos casos que se encuentran confirmados de COVID-19 para evaluar cómo se encuentra la situación epidemiológica actual.

En el siguiente gráfico se presenta el porcentual de las notificaciones por todos los virus y el de COVID realizados en la SE 01-45 del 2023.


**Gráfico 21.** Proporción de casos notificados de COVID y otros virus.  
Residentes de CABA. SE 1-45 2023. N=62.212.



Se evidencia un aumento de los casos de COVID a partir de la SE 29 en adelante. Sin embargo, los valores se encuentran por debajo de lo que sucedió en el año pasado.

A continuación, se expone la caracterización de los casos confirmados de COVID según grupo etario.

**Gráfico 22.** Casos y tasa de COVID (x 10.000 habitantes).  
Residentes de CABA. SE 1 a 45 2023. n=10.323\*.




De la misma manera que se presentó en el apartado de Internados, los casos confirmados de COVID se concentran en los mayores de 30 años. La mayor cantidad de casos se encuentran en el grupo de 40 a 49 años, sin embargo, la tasa más elevada se concentra en el grupo de 70 a 79 años.

Con respecto a la distribución por sexo, el 61,6% corresponde al sexo femenino.

En cuanto a la circulación de variantes de COVID se muestran a continuación una serie histórica de las variantes desde el 2021 hasta la SE 39 del 2023.

**Gráfico 23.** Casos y tasa de COVID (x 10.000 habitantes).  
Residentes de CABA. SE 1 a 39 2023. n=3634.



Fuente: SNVS<sup>2.0</sup>

Del gráfico podemos observar que, durante el año 2021 predominaron las variantes Delta y Lambda. Luego, desde el año 2022 hasta la SE 38 del 2023, la variante Omicrón y sus linajes dependientes fueron los más prevalentes.

## III. Vigilancia de Enfermedades transmitidas por el Mosquito *Aedes aegypti*

### III.1. INTRODUCCIÓN

#### III.1.A. Inicio presentación temporada 2023/2024

En este boletín epidemiológico se da comienzo a la presentación periódica del análisis de las enfermedades transmitidas por el mosquito *Aedes aegypti* (ETMAa) correspondiente a la temporada 2023/2024. Esta temporada se extiende desde la SE 27 de 2023, iniciada el pasado el 2 de julio, hasta la finalización de la SE 26 del próximo año.

Una síntesis de la información referida a la temporada 2021/2022 se encontrará en el BES N° 360 disponible en: <https://buenosaires.gob.ar/salud/boletines-epidemiologicos-semanales-2023>

Les recordamos que la información específica para el personal de salud se encuentra en el siguiente link

<https://buenosaires.gob.ar/informacion-para-equipos-de-salud>

dentro de la página de ETM del Ministerio de Salud de la Ciudad

#### III.1.B. Sobre el informe de las ETMAa

Las enfermedades transmitidas por mosquitos del género *Aedes aegypti* (ETMAa) constituyen un problema de salud pública en diversos países del mundo, incluyendo los de la región de las Américas. La transmisión resulta de la interacción entre personas, el hábito antropofílico de la hembra de esta especie de vector, las características de los diferentes virus y factores ambientales. Los movimientos humanos locales (casa a casa) favorecen la dinámica de transmisión, importante para la amplificación de estos virus y su posterior diseminación, lo cual, por otra parte, define patrones espaciales de incidencia y causa una marcada heterogeneidad en las tasas de transmisión. Por otra parte, especialmente en relación con el dengue, el agrupamiento de casos espaciotemporal determina que haya viviendas que contribuyen desproporcionadamente con la amplificación y diseminación viral.

Además de las necesarias actividades de prevención para la eliminación de criaderos del mosquito, es relevante la implementación adecuada de los mecanismos

de vigilancia epidemiológica. La detección temprana de estas enfermedades permite la generación de acciones oportunas y políticas sanitarias.

De acuerdo a los escenarios teóricos de riesgo que históricamente presenta la Ciudad de Buenos Aires, según la presencia o no del vector y la ocurrencia de casos, nos encontramos en el **Escenario 2: Riesgo medio**.

Se presentan los detalles más abajo, a continuación del detalle de la situación en relación con las ETMAa en la Región de las Américas y en nuestro país.

| <b>Escenario 0</b>                                                                          | <b>Escenario 1:<br/>Riesgo Bajo</b>                                                   | <b>Escenario 2:<br/>Riesgo Medio</b>                                                                                                              | <b>Escenario 3:<br/>Riesgo Alto</b>                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Julio-Septiembre</b>                                                                     | <b>Octubre-<br/>Noviembre</b>                                                         | <b>Diciembre-<br/>Febrero</b>                                                                                                                     | <b>Marzo-Junio</b>                                                                                                                     |
| Presencia de<br>huevos del vector<br>sin actividad<br>larvaria y sin<br>ocurrencia de casos | Baja presencia del<br>vector sin<br>existencia de casos<br>de Dengue y otras<br>ETMAa | Presencia del<br>vector con<br>existencia de casos<br>sospechosos de<br>dengue y otras<br>ETMAa<br>(Generalmente con<br>antecedente de<br>viaje). | Presencia del<br>vector con<br>existencia de casos<br>confirmados de<br>dengue y otras<br>ETMAa (con y sin<br>antecedente de<br>viaje) |

### III.1.C. Nota metodológica

La presentación sistemática de los datos de las ETMAa tiene como objetivo describir la notificación oficial realizada al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS), donde hasta el 28 de abril de 2018 se analiza la integración de los módulos C2 y SIVILA y a partir de esa fecha, los datos provenientes del SNVS<sup>2.0</sup>.

Para los informes se analizan las notificaciones cuyo lugar de residencia corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y aquellos donde la misma no presenta registros (residencia desconocida).

Para una mayor comprensión de las notificaciones de las ETMAa, se considera una determinación por paciente, por lo cual, si una persona es estudiada para diferentes eventos, dentro de las ETMAa, se considera solo uno de ellos teniendo en cuenta el algoritmo diagnóstico para estos eventos.

### III.1.D. Situación regional<sup>2</sup>

A continuación, se presentan los casos de dengue, dengue grave y fallecimientos según subregión de las Américas informados en 2023 hasta el 23/11/2023.

<sup>2</sup><https://www3.paho.org/data/index.php/es/temas/indicadores-dengue/dengue-regional/506-dengue-reg-ano-es.html>

**Tabla 1.** Casos de dengue y dengue grave según subregión de las Américas.  
Año 2023 (SE 1 a 47).

| REGION                         | TOTAL DE CASOS DE DENGUE | DENGUE GRAVE | MUERTES |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|---------|
| América del Norte              | 1099                     | 14           | 0       |
| Caribe Latino                  | 16476                    | 157          | 16      |
| Caribe no Latino               | 23064                    | 41           | 16      |
| Cono Sur                       | 3042661                  | 1474         | 1094    |
| Istmo Centroamericano y México | 476824                   | 1455         | 195     |
| Subregión Andina               | 541574                   | 3199         | 633     |
| Total Las Américas             | 4101698                  | 6340         | 1954    |

Fuente: Plataforma de Información en Salud de las Américas (PLISA)

De los números presentados anteriormente, la mayoría de los casos de la región corresponden a Brasil (2.909.404 notificaciones, 1474 casos graves y 1011 muertes). Con respecto a la circulación de serotipos, actualmente se encuentran DEN 1, 2 y 3, la mayoría de las localidades del país presentan circulación concomitante de DEN 1 y 2<sup>3</sup>.

Luego de Brasil, sigue Perú con 269.538 y el Estado Plurinacional de Bolivia con 143.425 notificaciones. con una tasa de incidencia de 753,9 casos por 100.000 habitantes, con un aumento del 16,5% de los casos, en comparación con igual período de 2022. La mayor incidencia se registró en la región Sur<sup>4</sup>.

Con respecto a F. Chikungunya, en igual período se presentaron 143.739 casos probables, con una tasa de incidencia de 67,4 casos por 100.000 habitantes, correspondientes a una reducción del 41% si se compara con el año 2022; la región Sudoeste presenta la mayor incidencia de casos.

En relación a los casos causados por el virus Zika, en 2023 hasta la SE 32 ocurrieron 8425 casos, que corresponde a una tasa de incidencia de 4,1 casos por 100.000 habitantes; con una reducción del 20,8% con respecto a 2022.

### III.1.E. Situación actual en Argentina<sup>5</sup>

Desde el Ministerio de Salud de la Nación se informó que desde la SE 01/2023 hasta el 45/2023, se han registrado 132.473 casos de dengue de los cuales 1915 fueron importados. La región con mayor cantidad de casos es el NOA seguido de la región Centro.

En cuanto a la circulación, en el país predominó el DENV-2 identificándose en el 79,10% de los casos sub tipificados (en todas las provincias del NOA y en la mayoría de la región Centro); seguido de DENV-1, en el 20,86%; y DENV-3 en muy baja circulación,

<sup>3</sup><https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2023/boletim-epidemiologico-volume-54-no-13/view>

<sup>4</sup><https://www3.paho.org/data/index.php/es/temas/indicadores-dengue/dengue-regional/506-dengue-reg-ano-es.html>

<sup>5</sup><https://bancos.salud.gob.ar/recurso/boletin-epidemiologico-nacional-n-678-se-45-2023>

con el 0,05%. En la región del NEA predominó en casi todas las provincias DENV-1, con excepción de Formosa donde se detectó una proporción mayor de casos de DENV-2 entre los subtipificados.

En las últimas 4 semanas, 13 departamentos pertenecientes a 4 jurisdicciones de la región NEA registraron casos **confirmados** autóctonos o en investigación: **Chaco** (1º de Mayo, 25 de Mayo, Bermejo, Comandante Fernández, Libertador General San Martín, Quitilipi, San Fernando, Sargento Cabral), **Corrientes** (Capital), **Formosa** (Pilcomayo) y **Misiones** (Capital, El Dorado e Iguazú). Con respecto al caso confirmado en el Noroeste de Buenos Aires, se determinó que cuenta con el antecedente de viaje a México. Los otros 173 departamentos que registraron casos autóctonos durante este año han pasado 28 días o más sin registrar nuevos casos.

### III.2. ETMAA EN LA CABA


Desde el inicio de la temporada 2023/2024 en la SE 27/2023 (2 de julio) hasta la SE 47/2022 (19 a 25 de noviembre), se notificaron 220 casos sospechosos de ETMAa, todos correspondientes a Dengue.

Se recuerda que en la detección y notificación de los casos están involucrados todos los efectores asistenciales, tanto del sector público como privado y de las OOSS.

#### III.2.A. Antecedentes y situación actual

En el siguiente gráfico, se muestran los casos notificados de residentes de la Ciudad, para todas las ETMAa desde la SE 26 de 2015, hasta la SE 47 de 2023.

**Gráfico 24.** Casos *notificados* de ETMAa según semana epidemiológica. Residentes de la CABA.  
Años 2016 (SE 1-52, n=12.098), 2017 (SE 1-52, n=636), 2018 (SE 1-52, n=623), 2019 (SE 1-52, n=385), 2020 (SE 1-53, n=12.302), 2021 (SE 1-52, n=433), 2022 (SE 1-52, n=200), 2023 (SE 1-47, n=21577).



Fuente: SNVS, SIVILA-C2, SNVS<sup>2.0</sup>


### III.3. DENGUE

#### III.3.A. Situación en la temporada 2023/2024 (SE 27 a SE 47 2023)

Entre las SE 27 2023 y 47 de 2023 fueron notificados 220 casos con sospecha de dengue, 55 de ellos sin antecedente de viaje y 31 con antecedente de viaje a áreas reconocidas de transmisión; mientras que en los restantes casos el dato no fue consignado en el SNVS<sup>2.0</sup>.

El siguiente gráfico da cuenta de la clasificación de los casos sospechosos de dengue notificados en 2023 entre las SE 27 a 47.


**Gráfico 25.** Notificaciones de dengue según clasificación.  
Residentes de la CABA. Año 2023. SE 27-47 (n=220).



Fuente: SNVS<sup>2.0</sup>

A continuación, se ampliará la información sobre los casos confirmados y probables hasta la SE 47 del año en curso.

**Gráfico 26.** Casos confirmados y probables de dengue por semana epidemiológica. Residentes de la CABA. Año 2023. SE 27-47 (n=23).




Fuente: SNVS<sup>2.0</sup>

Se observa que la presencia de casos confirmados fue continua en líneas generales a excepción de algunas semanas, siendo la misma sostenida por casos importados y no autóctonos de la Ciudad de Buenos Aires.

En el siguiente gráfico observaremos la distribución por comunas y su antecedente de viaje.

**Gráfico 27.** Casos confirmados y probables de dengue según comuna de residencia y antecedente de viaje. Residentes de la CABA. Año 2023. SE 27-47 (n=23).



Fuente: SNVS<sup>2.0</sup>

Cabe destacar que el caso de la comuna 13 sin antecedente de viaje, corresponde a un paciente con resultado de test rápido positivo el cual la muestra no fue derivada al centro de referencia para mayor información sobre el laboratorio.

Se observa que los casos confirmados correspondieron a la mayoría de las comunas con excepción de la comuna 9 y 12, siendo la región Centro con mayor cantidad de casos (60,9%)

Con respecto a los viajes, el 56,6% de los casos confirmados (13) contaron con viajes al exterior y provincias del país que aún mantienen circulación viral.


En el 85% (11 casos) de los casos se obtuvo la serotipificación, siendo el DEN-3 el serotipo con mayor prevalencia (6 casos) donde la mitad presentaron viaje a México. El resto correspondieron a DEN-1 (3 casos) y DEN-2 (2 casos).

Existieron dos casos confirmados con nexo epidemiológicos que correspondieron a familiares de pacientes con dengue provenientes del Chaco.

Continuamos realizando una ardua tarea para mejorar la información proveniente del sistema a fin de evitar los casos sin datos de viaje.

A continuación, se expone la distribución de los casos por grupo etario

**Gráfico 28.** Casos confirmados de dengue según grupo etario.  
Residentes de la CABA. Año 2023. SE 27-47 (n=23).



Hasta la SE 47 no se presentan casos confirmados en menores de 15 años. Predomina el sexo femenino con el 65% de las notificaciones.

En cuanto a la evolución clínica, sólo dos casos requirieron internación sin necesidad de permanecer en UTI los cuales recibieron el alta sin secuelas clínicas. No se registran casos fallecidos al momento de la edición de este boletín.

Es importante considerar que los síndromes febriles inespecíficos pueden estar asociados a otras patologías, como enfermedad por virus Zika, fiebre Chikungunya, encefalitis de San Luis, hantaviriosis y leptospirosis, entre otras. Se recomienda tener en cuenta estos distintos diagnósticos diferenciales de acuerdo a la presentación clínica y los antecedentes epidemiológicos encontrados.

En el contexto actual, se refuerzan las actividades de control y realización de los estudios de foco desde la sospecha de los casos con el fin de detección de posibles febriles, tareas de prevención y promoción de la salud.

### III.3.B. Casos históricos y comparación con los actuales

A continuación, se presenta la situación en la CABA en relación a los casos de dengue, comparando iguales semanas epidemiológicas de los 6 últimos años y el año en curso, incluyendo el antecedente de viaje.

Es importante destacar que en la temporada 2020/2021 los casos fueron notificados en el primer semestre del año 2021.

**Tabla 2.** Casos confirmados de dengue según antecedente de viaje.  
Residentes de la CABA. Entre las SE 27 y 47. 2016-2023.

| Antecedente de viaje | 2015 - 2016 | 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SI                   | 484         | 1           | 33          | 27          | 354         | 3           | 5           | 169         | 13          |
| NO                   | 5678        | 1           | 115         | 28          | 6920        | 1           | 0           | 7284        | 0           |
| Sin datos            | 232         | 0           | 1           | 4           | 7           | 0           | 1           | 4793        | 3           |
| TOTAL                | 6394        | 2           | 149         | 59          | 7281        | 4           | 6           | 12246       | 16          |

Fuente: SNVS, SIVILA-C2, SNVS<sup>2.0</sup>

