

N° 382

BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL

Información hasta SE 48
Año VIII | 15 de diciembre 2023
Ciudad Autónoma de Buenos Aires



AUTORIDADES

Jefe de Gobierno

Jorge Macri

Vicejefa de Gobierno

Clara Muzzio

Ministro de Salud

Fernán González Bernaldo de Quirós

Subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión en Red

Daniel Carlos Ferrante

Gerenta Operativa de Epidemiología

Cecilia González Lebrero

EQUIPO DE LA GERENCIA OPERATIVA DE EPIDEMIOLOGÍA

Integrantes del Equipo de trabajo

Enf. Jessica Natalia Agüero Sánchez

Dr. Cristián Biscayart

María Del Re

Dra. Susana Devoto

Lic. Yasmin El Ahmed

Bqca. María Aurelia Giboin Mazzola

Micaela López

Dra. Verónica Lucconi Grisolia

Dra. Deborah Sharff

Sebastian Tapuaj

Dra. Mónica Valenzuela

Dante Waisman

Lic. Hernán Zuberma

Data Entrys

Germán Adell

Rosalía Páez Pérez

Bianca Spirito

Elisa Mariel Villaverde

Integrantes de la Residencia Básica en
Epidemiología

Jefa de residentes: Dra. Agustina Villa

Lic. Camila Aquino

Lic. Sofía Harari

Dra. Sofía Monteverdi

Lic. Rocío Isabel Porro

Prof. Franca Salerno

ISSN 2545-6792 (en línea)

ISSN 2545-7004 (correo electrónico)

Gerencia Operativa de Epidemiología
Subsecretaría de Planificación Sanitaria
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

<http://www.buenosaires.gob.ar/salud/epidemiologia>
gerenciaepicaba@buenosaires.gob.ar
Tel.: 4123-3240

Monasterio 480, CABA

INDICE

I. REPORTE DE ENFERMEDADES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.....	7
I.1. DETALLE DE LA NOTIFICACIÓN POR GRUPO DE EVENTOS	10
I.1.A. De transmisión vertical y sexual.....	10
I.1.B. Envenenamiento por animal ponzoñoso.....	10
I.1.C. Hepatitis.....	10
I.1.D. Infecciones invasivas.....	10
I.1.E. Inmunoprevenibles.....	10
I.1.F. Intoxicaciones	10
I.1.G. Lesiones intencionales.....	11
I.1.H. Lesiones no intencionales.....	11
I.1.I. Meningitis y meningoencefalitis.....	11
I.1.J. Transmitidas por alimentos, agua o ruta fecal-oral.....	11
I.1.K. Tuberculosis y lepra.....	11
I.1.L. Zoonóticas y por vectores	11
II. VIGILANCIA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	12
II.1. INTRODUCCIÓN	12
II.1.A. Nota metodológica	12
II.1.B. Sobre el informe de IRA	12
II.2. SITUACIÓN NACIONAL	12
II.2.A. Vigilancia clínica.....	12
II.2.B. Vigilancia de virus respiratorios en unidades de monitoreo de pacientes ambulatorios (UMA)	13
II.2.C. Vigilancia de virus respiratorios en pacientes internados.....	13
II.3. SITUACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. AÑOS 2019-2023	13
II.3.A. Vigilancia de laboratorio agrupada años 2019-2023.....	13
II.3.B. Vigilancia clínica agrupada años 2019-2023.....	17
II.3.C. Vigilancia de COVID-19, Influenza y otros virus respiratorios en personas internadas.....	20
II.3.D. Vigilancia de pacientes internados.....	21
II.3.E. Vigilancia de SARS-CoV-2, influenza y otros virus respiratorios (OVR) en Unidades de Monitoreo de Ambulatorios (UMA).....	25
II.3.F. Vigilancia de SARS-CoV-2, influenza y otros virus respiratorios (OVR) No UMA	27
III. VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL MOSQUITO AEDES AEGYPTI	30
III.1. INTRODUCCIÓN	30
III.1.A. Inicio presentación temporada 2023/2024.....	30
III.1.B. Sobre el informe de las ETMAA.....	30
III.1.C. Nota metodológica	31
III.1.D. Situación regional.....	31
III.1.E. Situación actual en Argentina.....	32
III.2. ETMAA EN LA CABA	33
III.2.A. Antecedentes y situación actual	33
III.3. DENGUE	34
III.3.A. Situación en la temporada 2023/2024 (SE 27 a SE 50 2023)	34
III.3.B. Casos históricos y comparación con los actuales.....	38

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

EDITORIAL


¡Hola a todxs!

En el camino comenzado en 2016 fuimos incorporando, modificando e implementando nueva información con el propósito principal de retroalimentar el sistema de vigilancia, considerando la actividad y dándole importancia al trabajo de los distintos niveles locales. Cada persona que integra el sistema de salud genera información primaria valiosa y necesaria para la toma de decisiones.

La elaboración del BES, por lo tanto, es el reflejo vivo y dinámico de la realidad epidemiológica. Semana a semana emergen nuevos datos. En principio, producto de las nuevas notificaciones, luego, con el arduo trabajo que implica el análisis de cada caso en conjunto con los distintos actores involucrados: referentes de epidemiología de cada área programática de la Ciudad, laboratorios de la red y los de referencia, y la permanente interacción con el Ministerio de Salud de la Nación y con el resto de las jurisdicciones.

Transitamos un contexto sanitario global desafiante, pero al mismo tiempo lleno de oportunidades e innovación. Hemos atravesado enormes dificultades y es por esto que les agradecemos por habernos acompañado en este derrotero, esperando que sigan acompañándonos en lo que continúa.

¡Saludos de todos los que formamos parte de la GOE!.



Cecilia González Lebrero
Gerenta Operativa de
Epidemiología
Subsecretaría de Planificación Sanitaria
Ministerio de Salud, CABA

INTRODUCCIÓN

La epidemiología en la gestión tiene como uno de los pilares la recolección, sistematización y análisis de los datos de diferentes fuentes en forma sistemática, periódica y oportuna, para convertirlos en información integrada con el fin de divulgarlos y que esta información permita generar acciones por parte diferentes actores y actrices involucrados en el concierto de la Salud.

El presente boletín es un producto completamente dinámico que pretende cumplir con varios objetivos, entre ellos, hay dos primordiales.

El primero es devolver, consolidada y sistematizada, la información mínima vertida por los servicios a través de los diferentes sistemas de información.

Junto con la retroalimentación del sistema, el objetivo primario del BES es dar cuenta de la situación epidemiológica actual. En especial, esto se realiza a través de los eventos de notificación obligatoria por medio de tablas y gráficos y de eventos seleccionados por su importancia estacional o de gestión.

A lo anterior, se incorporan otras fuentes de datos, consolidados y análisis especiales que pretenden dar cuenta de la situación epidemiológica.

Este boletín es posible gracias al compromiso de los efectores de salud públicos y privados que se involucran en la tarea de vigilancia. El equipo de la gerencia agradece los trabajos remitidos para ser difundidos a través de esta publicación e invita a continuar el envío de los mismos para su divulgación y enriquecimiento de los BES.

RESUMEN EJECUTIVO

Se exponen los datos comparativos hasta la semana epidemiológica (SE) 48 de los años 2022 y 2023 por grupo de eventos nominales y agrupados de notificación obligatoria.

Se incluye un informe sobre la vigilancia de las enfermedades respiratorias hasta la SE 48.

Se presenta el informe de inicio de temporada de dengue 2023-2024 hasta la SE 50.

I. Reporte de enfermedades en la Ciudad de Buenos Aires

En las siguientes tablas se presentan el total de las notificaciones nominales y agrupadas, provenientes de la integración de los módulos C2 y SIVILA del SNVS hasta el 28 de abril de 2018 y a partir de esa fecha, el SNVS^{2.0}, correspondientes a residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las mismas son cotejadas caso por caso, para evitar la presencia de notificaciones duplicadas y lograr la obtención de una base consolidada aprovechando los atributos de los dos módulos.

Las siguientes tablas se conforman con las notificaciones que contienen datos de domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto con los casos donde no figura esta referencia. Por lo tanto, dependiendo el evento, la información puede contener sesgos, para lo cual la GOE está trabajando continuamente para la mejora de la calidad de los datos.

La información que se presenta a continuación es la acumulada hasta la **SE 46** del corriente año (finalizada el 18 de noviembre) y se compara con el mismo período del año 2022 mostrando el aumento o descenso en las columnas “diferencia de casos” - donde se presenta la diferencia absoluta entre un año y el otro (por ser menos de 20 casos)- y “variación porcentual” (para los eventos como más de 20 casos).

Tabla 1. Notificaciones de casos acumulados agrupados hasta la SE 48. Residentes de CABA.
Comparación 2022-2023

Notificaciones de casos acumulados agrupados hasta la SE 48 en Residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires					
Grupo de eventos	Evento	2022	2023	Dif. de casos	Variación %
De transmisión sexual	Secreción genital en mujeres	951	672		-29
	Secreción genital purulenta en varones	38	70		84
	Secreción genital sin especificar en varones	54	51		-6
	Sífilis sin especificar en mujeres (ITS)	248	273		10
	Sífilis sin especificar en varones (ITS)	322	329		2
	Sífilis temprana en mujeres	42	68		62
	Sífilis Temprana en varones	94	122		30
Gastroentéricas	Diarreas	8697	10549		21
Inmunoprevenibles	Parotiditis	189	129		-32
	Varicela	371	343		-8
Internaciones por lesiones en el hogar*	Lesiones en el hogar sin especificar	0	7	7	
	Lesiones por caídas y golpes	0	75	75	
	Lesiones por cortes y quemaduras	0	9	9	
	Otras lesiones en el hogar	0	1	1	
Internaciones por siniestros viales*	Conductor o pasajero de automovil	0	11	11	
	Conductor o pasajero de motocicleta	0	14	14	
	Peatón	0	5	5	
	Ciclista	0	1	1	
Lesiones por mordedura de perro (ambulatorios)*	Perro conocido en la vía pública	0	135	135	
	Perro desconocido en la vía pública	0	97	97	
	Perro en la vivienda	0	215	215	
	Perro sin especificar	0	141	141	

* En el 2022 no se presentan casos de estos grupos de eventos ya que no formaban parte de los ENOs.

Fuente: SNVS 2.0

Tabla 2. Notificaciones de casos acumulados nominales hasta la SE 48. Residentes de CABA.
Comparación 2022-2023

Notificaciones de casos acumulados hasta la SE 48 en Residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires					
Grupo de eventos	Evento	2022	2023	Dif. de casos	Variación %
De transmisión vertical	CHAGAS AGUDO CONGÉNITO	113	98		-13
	CHAGAS CRÓNICO EN EMBARAZADAS	105	62		-41
	SÍFILIS CONGÉNITA	96	55		-43
	SÍFILIS EN EMBARAZADA	259	264		2
Envenenamiento por animal ponzoñoso	ALACRANISMO	8	11	3	
	ARANEISMO	1	3	2	
	OFIDISMO	3	1	-2	
Hepatitis	HEPATITIS A	22	10	-12	
	HEPATITIS B	122	66		-46
	HEPATITIS B EN BANCOS DE SANGRE	89	77		-13
	HEPATITIS C	135	136		1
	HEPATITIS C EN BANCOS DE SANGRE	22	28	6	
	HEPATITIS AGUDA GRAVE DE ORIGEN DESCONOCIDO	5	1	-4	
	INFECCIONES INVASIVAS POR Haemophilus influenzae	10	5	-5	
Infecciones invasivas	INFECCIONES INVASIVAS POR Neisseria Meningitidis	3	1	-2	
	INFECCIONES INVASIVAS POR OTROS AGENTES	3	22	19	
	INFECCIONES INVASIVAS POR Streptococcus pneumoniae	5	41	36	
	INFECCIONES INVASIVAS POR Streptococco Pyogenes	7	85	78	
	COQUELUCHE	37	19	-18	
Inmunoprevenibles	DIFTERIA	0	0	0	
	EFE (SARAMPIÓN-RUBEOLA)	78	20	-58	
	PAF	9	3	-6	
	PAROTIDITIS	18	40	22	
Intoxicaciones	MEDICAMENTOSA	2	11	9	
	POR METALES PESADOS	78	0	-78	
	POR MONÓXIDO DE CARBONO	51	60		18
	POR OTROS TÓXICOS	2	1	-1	
	POR PLAGUICIDAS	0	0	0	
	POR PLAGUICIDAS DE USO DOMÉSTICO	0	0	0	

Nota: La información de la tabla es parcial y sujeta a modificaciones; se incluyen casos notificados con lugar de residencia en la CABA que pueden haber presentado antecedente de viaje.

Fuente: SNVS 2.0

Notificaciones de casos acumulados hasta la SE 48 en Residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Grupo de eventos	Evento	2022	2023	Dif. de casos	Variación %
Lesiones intencionales	INTENTOS DE SUICIDIO	0	69	69	
Lesiones no intencionales	LESIONES GRAVES POR MORDEDURA DE PERRO	0	4	4	
	POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	3	0	-3	
	BACTERIANA POR OTROS AGENTES	1	8	7	
	BACTERIANA SIN ESPECIFICAR AGENTE	2	4	2	
	OTROS GERMESES NO BACT. NI VIRALES	0	1	1	
	TUBERCULOSA	6	0	-6	
	POR OTROS VIRUS	1	2		
	POR STREPTOCOCCO NEUMONIAE	13	11	-2	
	SIN ESPECIFICAR ETIOLOGIA	30	24	-6	
	MICOTICAS Y PARASITARIAS	3	4	1	
	VIRALES POR ENTEROVIRUS	2	3	1	
	VIRALES POR OTROS AGENTES	1	3	2	
	VIRALES SIN ESPECIFICAR AGENTES	4	5	1	
	VIRALES URLEANAS	0	0	0	
	POR NEISSERIA MENINGITIDIS	0	6	6	
	TUBERCULOSA < 5 AÑOS	0	1	1	
	BOTULISMO	4	0	-4	
	BOTULISMO DEL LACTANTE	0	1	1	
	DIARREAS AGUDAS SANGUINOLIENTAS	204	165		-19
	DIARREAS BACTERIANAS	107	105		-2
	DIARREAS VIRALES	13	6	-7	
	FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA	9	7	-2	
	LISTERIOSIS	0	2	2	
	SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO (SUH)	19	13	-6	
	TRIQUINOSIS	1	2	1	
	LEPRA	3	2	-1	
	TUBERCULOSIS	1403	1384		-1
	BRUCELOSIS	10	6	-4	
	DENGUE	181	21368		11706
	ZIKA (TODOS LOS EVENTOS)	0	0		
	FIEBRE CHIKUNGUNYA	0	231	231	
	FIEBRE AMARILLA	2	1	-1	
	FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL	2	2	0	
	FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA	2	1		
	HANTAVIROSI	18	28	10	
	PSITACOSIS	6	13	7	
	LEISHMANIASIS CUTÁNEA	1	2	1	
	LEISHMANIASIS VISCERAL	4	2	-2	
	LEPTOSPIROSIS	26	20	-6	
	PALUDISMO	6	10	4	
	RICKETTSIOSIS	7	1	-6	
	VIRUS DE LA ENCEFALITIS DE SAN LUIS	2	4	2	
	VIRUELA SÍMICA	847	136		-84

Nota: La información de la tabla es parcial y sujeta a modificaciones; se incluyen casos notificados con lugar de residencia en la CABA que pueden haber presentado antecedente de viaje.

Fuente: SNVS 2.0

I.1. DETALLE DE LA NOTIFICACIÓN POR GRUPO DE EVENTOS

Las tablas que se exponen a continuación corresponden al detalle de la Consolidada por Grupo de Eventos ([ítem I](#)), presentando los datos ampliados según el criterio epidemiológico de clasificación del caso. Por lo tanto, las especificaciones de metodología son las descriptas anteriormente.

En todos los casos, las referencias son: C=confirmado; P=probable; S=sospechoso; D=descartado.

I.1.A. De transmisión vertical y sexual

GRUPO DE EVENTO	EVENTO	2022					2023					DIF. DE CASOS	VAR. %
		C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
De transmisión vertical	CHAGAS AGUDO CONGÉNITO	11	0	56	46	113	3	0	86	9	98		13
	CHAGAS CRÓNICO EN EMBARAZADAS	105	0	0	0	105	62	0	0	0	62		-41
	SÍFILIS CONGÉNITA	68	0	5	23	96	54	0	0	1	55		-43
	SÍFILIS EN EMBARAZADA	259	0	0	0	259	264	0	0	0	264		2

I.1.B. Envenenamiento por animal ponzoñoso

GRUPO DE EVENTO	EVENTO	2022					2023					DIF. DE CASOS	VAR. %
		C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
Envenenamiento por animal ponzoñoso	ALACRANISMO	8	0	0	0	8	7	0	4	0	11		3
	ARANEISMO	0	0	1	0	1	2	0	1	0	3		2
	OFIDISMO	3	0	0	0	3	1	0	0	0	1		-2

* Los casos confirmados de Ofidismo corresponden a cuatro residentes de CABA: tres con antecedente de viaje a Córdoba y Entre Ríos y uno trabajador de áreas protegidas.

I.1.C. Hepatitis

GRUPO DE EVENTO	EVENTO	2022					2023					DIF. DE CASOS	VAR. %
		C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
Hepatitis	HEPATITIS A	16	0	2	4	22	8	0	1	1	10		-12
	HEPATITIS B	85	12	22	3	122	45	6	15	0	66		-46
	HEPATITIS B EN BANCOS DE SANGRE	0	27	62	0	89	0	19	58	0	77		-13
	HEPATITIS C	48	39	27	21	135	96	20	19	1	136		1
	HEPATITIS C EN BANCOS DE SANGRE	0	4	18	0	22	0	3	25	0	28		6
	HEPATITIS AGUDA GRAVE DE ORIGEN DESCONOCIDO	0	1	3	1	5	0	0	1	0	1		-4

I.1.D. Infecciones invasivas

GRUPO DE EVENTO	EVENTO	2022					2023					DIF. DE CASOS	VAR. %
		C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
Infecciones invasivas	INFECCIONES INVASIVAS POR <i>Haemophilus influenzae</i>	9	1	0	0	10	5	0	0	0	5		-5
	INFECCIONES INVASIVAS POR <i>Neisseria Meningitidis</i>	3	0	0	0	3	1	0	0	0	1		-2
	INFECCIONES INVASIVAS POR OTROS AGENTES	2	0	1	0	3	18	1	3	0	22		19
	INFECCIONES INVASIVAS POR <i>Streptococcus pneumoniae</i>	5	0	0	0	5	41	0	0	0	41		36
	INFECCIONES INVASIVAS POR <i>Streptococcus Pyogenes</i>	7	0	0	0	7	85	0	0	0	85		78

I.1.E. Inmunoprevenibles

GRUPO DE EVENTO	EVENTO	2022					2023					DIF. DE CASOS	VAR. %
		C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
Inmunoprevenibles	COQUELUCE	2	2	2	31	37	3	1	2	13	19		-18
	DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	EFE (SARAMPiÓN-RUBEOLA)	1	0	0	77	78	1	0	4	15	20		-58
	PAF	0	0	0	9	9	0	0	3	0	3		-6
	PAROTIDITIS	5	0	13	0	18	29	0	11	0	40		22

I.1.F. Intoxicaciones

GRUPO DE EVENTO	EVENTO	2022					2023					DIF. DE CASOS	VAR. %
		C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		
Intoxicaciones	MEDICAMENTOSA	2	0	0	0	2	7	0	4	0	11		9
	POR METALES PESADOS	2	4	1	71	78	0	0	0	0	0		-78
	POR MONÓXIDO DE CARBONO	37	0	14	0	51	51	0	9	0	60		18
	POR OTROS TÓXICOS	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1		-1
	POR PLAGUICIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	POR PLAGUICIDAS DE USO DOMÉSTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

I.1.G. Lesiones intencionales

GRUPO DE EVENTO	EVENTO	2022					2023					DIF. DE CASOS
		C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL	

Lesiones intencionales	INTENTOS DE SUICIDIO	0	0	0	0	0	69	0	0	0	69	69
------------------------	----------------------	---	---	---	---	---	----	---	---	---	----	----

* En el 2022 no se presentan casos de estos grupos de eventos ya que no formaban parte de los ENOs.

De la totalidad de los casos confirmados solo uno corresponde a intentos de suicidio con resultado mortal

I.1.H. Lesiones no intencionales

GRUPO DE EVENTO	EVENTO	2022					2023					DIF. DE CASOS
		C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL	

Lesiones no intencionales	LESIONES GRAVES POR MORDEDURA DE PERRO	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	4
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* En el 2022 no se presentan casos de estos grupos de eventos ya que no formaban parte de los ENOs.

I.1.I. Meningitis y meningoencefalitis

GRUPO DE EVENTO	EVENTO	2022					2023					DIF. DE CASOS
		C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL	

Meningitis y meningoencefalitis	POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	-3
	BACTERIANA POR OTROS AGENTES	0	0	1	0	1	6	2	0	0	8	7
	BACTERIANA SIN ESPECIFICAR AGENTE	0	0	2	0	2	1	3	0	0	4	2
	OTROS GERMESES NO BACT. NI VIRALES	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	TUBERCULOSA	5	0	0	1	6	0	0	0	0	0	-6
	POR OTROS VIRUS	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1
	POR STREPTOCOCCO NEUMONIAE	13	0	0	0	13	11	0	0	0	11	-2
	SIN ESPECIFICAR ETIOLOGIA	5	0	18	7	30	10	5	8	1	24	-6
	MICOTICAS Y PARASITARIAS	3	0	0	0	3	4	0	0	0	4	1
	VIRALES POR ENTEROVIRUS	2	0	0	0	2	3	0	0	0	3	1
	VIRALES POR OTROS AGENTES	0	0	1	0	1	1	2	0	0	3	2
	VIRALES SIN ESPECIFICAR AGENTES	0	0	4	0	4	4	1	0	0	5	1
	VIRALES URLEANAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	POR NEISSERIA MENINGITIDIS	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	6
	TUBERCULOSA < 5 AÑOS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1

I.1.J. Transmitidas por alimentos, agua o ruta fecal-oral

GRUPO DE EVENTO	EVENTO	2022					2023					DIF. DE CASOS	VAR. %
		C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		

Transmitidas por alimentos, agua o ruta fecal-oral	BOTULISMO	2	0	1	1	4	0	0	0	0	0	-4	
	BOTULISMO DEL LACTANTE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	
	DIARREAS AGUDAS SANGUINOLIENTAS	204	0	0	0	204	165	0	0	0	165	-39	-19
	DIARREAS BACTERIANAS	107	0	0	0	107	105	0	0	0	105	-2	-2
	DIARREAS VIRALES	13	0	0	0	13	6	0	0	0	6	-7	
	FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA	9	0	0	0	9	4	1	2	0	7	-2	
	LISTERIOSIS	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	
	SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO (SUH)	19	0	0	0	19	13	0	0	0	13	-6	
	TRIQUINOSIS	0	0	1	0	1	1	0	1	0	2	1	

I.1.K. Tuberculosis y lepra

GRUPO DE EVENTO	EVENTO	2022					2023					DIF. DE CASOS	VAR. %
		C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		

Tuberculosis y lepra	LEPRA	3	0	0	0	3	1	0	1	0	2	-1	
	TUBERCULOSIS	1403	0	0	0	1403	1384	0	0	0	1384	-1	-1

I.1.L. Zoonóticas y por vectores

GRUPO DE EVENTO	EVENTO	2022					2023					DIF. DE CASOS	VAR. %
		C	P	S	D	TOTAL	C	P	S	D	TOTAL		

Zoonóticas y por vectores	BRUCELOSIS	3	1	2	4	10	2	1	3	0	6	-4	
	DENGUE	7	3	9	162	181	12259	1482	6350	1277	21368	11706	
	ZIKA (TODOS LOS EVENTOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	FIEBRE CHIKUNGUNYA	0	0	0	0	0	151	15	57	8	231	231	
	FIEBRE AMARILLA	0	0	0	2	2	0	0	1	0	1	-1	
	FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL	0	0	0	2	2	1	0	0	1	2	0	
	FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA	1	0	1	0	2	0	0	0	1	1	-1	
	HANTAVIROSIS	1	0	0	17	18	0	0	3	25	28	10	
	PSITACOSIS	2	0	4	0	6	7	1	2	3	13	7	
	LEISHMANIASIS CUTÁNEA	0	0	1	0	1	2	0	0	0	2	1	
	LEISHMANIASIS VISCERAL	0	1	1	2	4	0	0	1	1	2	-2	
	LEPTOSPIROSIS	1	0	4	21	26	2	1	6	11	20	-6	
	PALUDISMO	2	0	4	0	6	7	0	1	2	10	4	
	RICKETTSIOSIS	2	0	2	3	7	0	0	1	0	1	-6	
	VIRUS DE LA ENCEFALITIS DE SAN LUIS	0	0	0	2	2	1	0	1	2	4	2	
	VIRUELA SÍMICA	601	0	18	228	847	44	0	19	73	136	-84	

II. Vigilancia de Enfermedades respiratorias

II.1. INTRODUCCIÓN

II.1.A. Nota metodológica

Los datos provienen de la notificación oficial realizada al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS), donde hasta el 28 de abril de 2018 se analiza por la integración de los módulos C2 y SIVILA y a partir de esa fecha del SNVS^{2.0}.

Para los informes se analizan las notificaciones realizadas por efectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

II.1.B. Sobre el informe de IRA

A continuación, se presentará de manera breve la situación de las Infecciones respiratorias agudas, en particular aquellas notificaciones correspondientes a la vigilancia de laboratorio que han sido realizadas de manera agrupada, hasta la Semana Epidemiológica (SE) actual según los datos de la notificación en el SNVS^{2.0} y las notificaciones nominales de eventos seleccionados.

II.2. SITUACIÓN NACIONAL¹

II.2.A. Vigilancia clínica

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional con información reportada hasta la semana epidemiológica 45, entre la SE 1-46 del año 2023 se notificaron en el componente de Vigilancia Clínica del SNVS 213.165 casos de Bronquiolitis, con una tasa de incidencia acumulada de 14.611,1 casos/100.000 habitantes.

Con respecto al evento Neumonía, entre la SE 01-46 del año 2023 se notificaron en el componente de Vigilancia Clínica del SNVS 164.034 casos de Neumonía, con una incidencia acumulada de 351,6 casos/100.000 habitantes.

Con respecto al número de notificaciones de neumonías en las semanas 1 a 46 del período 2014-2023, se observa que el año con mayor número de notificaciones fue 2016, seguido por 2022 y 2017. En la presente temporada el número de casos registrados es menor en relación con la mayoría de los años incluidos en el periodo, a excepción de 2014 y 2018-2020.

Entre la SE 1-46 del año 2023 se notificaron en el componente de Vigilancia Clínica del SNVS 1.015.896 casos de ETI, con una tasa de incidencia acumulada de 2177,5 casos/100.000 habitantes.

¹<https://bancos.salud.gob.ar/recurso/boletin-epidemiologico-nacional-n-680-se-47-2023>

Para el evento COVID-19, los casos acumulados del 2023 hasta la SE 46 se encuentran por debajo del año 2021 y 2022 para el mismo período. Lo mismo ocurre con los fallecidos. A partir de la SE 30, se observa un aumento de número de casos con un promedio de 3089 casos y 21 fallecidos. En las últimas 12 semanas se observa un descenso del número semanal de casos.

II.2.B. Vigilancia de virus respiratorios en unidades de monitoreo de pacientes ambulatorios (UMA)

Con respecto a la estrategia de vigilancia de las UMA, entre la SE 16/2022 y la 46/2023 el porcentaje de positividad entre las muestras analizadas por rt-PCR es de 18,28%, 17,23% y 3,45% para SARS-CoV-2, Influenza y VSR respectivamente.

En cuanto a las Influenza, la distribución de las mismas fue similar tanto para Influenza A y B. Respecto a las Influenza A que fueron suptipificadas, el 51,36% correspondieron al H1N1. En cambio, para el 97,6% de las Influenza B no se pudo obtener el linaje.

II.2.C. Vigilancia de virus respiratorios en pacientes internados

En cuanto a casos acumulados entre la SE 23/2022 y la SE 46/2023, el porcentaje de positividad para SARS-CoV-2 en pacientes hospitalizados fue de 11,29%. Con respecto a las Influenza, el 15,02% de las muestras resultaron positivas predominando las Influenza A (H1N1 pdm09).


Para el mismo período el porcentaje de positividad para VSR es de 30,47% el cual presentó un aumento entre las SE 13 y 21 para luego presentar un descenso.

II.3.SITUACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. AÑOS 2019-2023

II.3.A. Vigilancia de laboratorio agrupada años 2019-2023

En el siguiente gráfico se presenta la distribución de muestras positivas según año y tipo de virus hasta la SE 48 de 2023.


Gráfico 1. Muestras positivas según virus y porcentaje de positividad.
Año 2019 n= 6744; Año 2020 n= 654; Año 2021 n=4122; Año 2022 n= 11404, Año 2023 (h SE 48) n=8467



Fuente: SNVS^{2.0}

Como se puede observar, la aparición de aislamientos de VSR se adelantó un par de semanas con respecto a los años anteriores.

Gráfico 2. Circulación Viral Global. Distribución porcentual de determinaciones de SE 1-45
Año 2019 n= 6645; Año 2020 n=611; Año 2021 n=4095; Año 2022 n= 11147, Año 2023 n=8467.



Fuente: SNVS^{2.0}


Se puede observar en el gráfico comparando los años desde la SE 1-48, el predominio del Virus Sincial Respiratorio (VSR) en los años 2019, 2021 y 2023 mientras

que en 2020 se verifica una mayor proporción de Adenovirus. Durante el año 2022, se registró una proporción igual de Influenza A y Metapneumovirus.

Hasta la SE 48 del corriente año, se observa una mayor circulación de Virus Sincial con un 51,0% de muestras positivas, seguido por la Influenza A con un 16,5%.

A continuación, se presenta el total de las muestras estudiadas y positivas a virus respiratorios para el año 2023 hasta la SE 48.

Gráfico 3. Circulación Viral Global. Distribución porcentual de determinaciones.
Año 2023. Hasta SE 48. n=193.684. CABA




Fuente: SNVS^{2.0}

Hasta la SE en análisis, se estudiaron 193.684 muestras donde el 4,4% (8467) resultaron positivas.

A continuación, se representan la distribución de las muestras positivas según virus por semana epidemiológica.

Gráfico 4. Circulación Viral Global por semana epidemiológica. Año 2023.
Hasta SE 48. n=8467. CABA




Fuente: SNVS^{2.0}

Como se ve en el gráfico, durante las SE 1 a la 12 el Adenovirus era predominante en las muestras testeadas, viendo que a partir de la SE 13 el VSR predomina en las muestras analizadas. A partir de la SE 17 la Influenza A comienza a ser detectada, teniendo en las SE subsiguientes un crecimiento. Se registra un leve aumento de Metapneumovirus en la semana 28 y 31.

En los siguientes gráficos se exponen la circulación global y absoluto de los virus según grupo etario para el año en curso.

Gráfico 5. Circulación Viral - Distribución de determinaciones según grupo etario.
Año 2023. Hasta SE 48. n=8064*. CABA



Fuente: SNVS^{2.0}* Se excluye la categoría "Sin especificar edad"

En el gráfico anterior se observa que el VSR es predominante en los menores de 10 años. Para los grupos etarios comprendidos entre los 20 a 74 años, la Influenza A es el mayor aislamiento.

En la siguiente tabla se presentan el número de muestras estudiadas y su correspondiente porcentaje de positividad según efector público de notificación.

Tabla 3. Número de muestras y porcentaje de positividad según efector público de notificación.
Año 2023. Hasta SE 48. CABA

Establecimiento de notificación	Total población	
	Estudiadas	% positividad
GARRAHAN	71453	4,7%
GUTIERREZ	48124	5,5%
MUÑIZ	34350	2,6%
ELIZALDE	25622	3,6%
DURAND	11630	5,0%
RIVADAVIA	11784	3,7%
PIROVANO	7467	3,7%
SANTOJANNI	6294	6,3%
ZUBIZARRETA	4841	7,2%
PIÑERO	3565	5,4%
ARGERICH	3462	4,5%
ALVAREZ	2486	6,2%
RAMOS MEJIA	1935	4,5%
VELEZ SANSFIELD	1440	4,4%
OTROS*	2001	7,5%
Total general	236454	4,5%

Fuente: SNVS^{2.0}

*Cinco efectores con muestras estudiadas menores a 1000

Con respecto a los efectores, se evidencia que los efectores del subsector público son aquellos que notifican mayormente al SNVS^{2.0}.

II.3.B. Vigilancia clínica agrupada años 2019-2023


En el siguiente apartado se analizarán los eventos notificados bajo la vigilancia agrupada clínica.

Tabla 4. Número de casos de eventos respiratorios. Años 2019-2023 hasta SE 48. CABA

Evento	2019	2020	2021	2022	2023
Bronquiolitis en menores de 2 años	9230	1048	3368	4248	2192
Enfermedad tipo influenza	19422	10996	15960	31140	10249
Neumonía	5543	3250	4598	7689	4121
Total general	34195	15294	23926	43077	16562

Fuente: SNVS^{2.0}

Gráfico 6. Casos de eventos respiratorios por semana epidemiológica.
Año 2023. Hasta SE 48. n=16.562. CABA



Fuente: SNVS^{2.0}


La notificación para las enfermedades tipo influenza (ETI) predominaron desde el inicio del año en curso, presentando un descenso desde la SE 26 con un posterior leve aumento en la SE 31.

Sin embargo, las bronquiolititis en menores de 2 años presentan un leve aumento desde la SE 19 con un pico en la SE 22 y un posterior descenso gradual.

Para el caso de las neumonías, si bien registran notificaciones a lo largo del 2023, se observa un aumento a partir de la SE 22 con un posterior descenso desde la SE 27.

Los aumentos evidenciados se condicen con la temporada invernal.

Gráfico 7. Distribución porcentual de eventos según grupo etario.
Año 2023. Hasta SE 47. n=16.498*. CABA




Fuente: SNVS^{2.0}* Se excluye la categoría "Sin especificar edad"

Como puede observarse dentro de las enfermedades tipo influenza (ETI) se evidencia una mayor notificación en los grupos etarios mayores de 2 años. Por el contrario, las Neumonías predominan en los mayores de 75 años.


A continuación, se presentan los corredores endémicos de los eventos analizados contruidos en base a los últimos 5 años endémicos.

Gráfico 8. Corredor endémico semanal de Bronquiolitis en menores de 2 años.
Año 2023. Hasta SE 47. Residentes de la CABA




Fuente: SNVS^{2.0}

Gráfico 9. Corredor endémico semanal de Neumonías.
Año 2023. Hasta SE 47. Residentes de la CABA



Fuente: SNVS^{2.0}

Gráfico 10. Corredor endémico semanal de Enfermedades tipo Influenza.
Año 2023. Hasta SE 47. Residentes de la CABA



Fuente: SNVS^{2.0}


Se observa que, para las bronquiolitis y ETI, en la SE 21 se posicionaron en la zona de alarma para luego descender a una zona de seguridad. En cambio, para las neumonías, desde la SE 21 hasta la SE 33 se encontraron en zona de alarma, luego se posicionó en zona de seguridad. Posteriormente, durante la SE 38 se ubicó levemente en zona de alarma/brote para luego descender hacia la zona de seguridad y éxito.

Cabe destacar que las notificaciones para los eventos agrupados clínicos presentan una baja en la semana analizada debido a un retraso en la notificación.

II.3.C. Vigilancia de COVID-19, Influenza y otros virus respiratorios en personas internadas

Entre la SE 21/2022 a SE 48/2023, se notificaron en el evento de Internado y/o fallecido por COVID u OVR, 53.088 casos, siendo el 39,4% de casos residentes de CABA.

Gráfico 11. Distribución porcentual de notificaciones de Internados y/o fallecidos por COVID u OVR según residencia. SE 21-2022 a SE 48-2023 – n=53.088. CABA



Fuente: SNVS^{2.0}

Teniendo en cuenta solo el año en curso hasta la SE 48, se notificaron 24.797 casos de internados, siendo el 35,9% (8913) pacientes residentes de la jurisdicción. Dentro de los residentes el 51,6% corresponde a pacientes femeninos.

De las notificaciones que corresponden a residentes de CABA en el mismo período (SE 1-48 2023), solo al 30,7% (2733) se les realizó el diagnóstico etiológico por biología molecular. Dentro de los resultados, al 48,2% (1317) se les ha diagnosticado SARS COV-2, y el 25,1% (685) VSR.


A partir de la SE 16 del 2023, se detectan los primeros casos de Influenza A H1N1 e Influenza A sin subtipificar.

II.3.D. Vigilancia de pacientes internados

En este apartado se toman en cuenta todas las notificaciones, en el evento Internado y/o fallecido por COVID o IRA, tanto de manera universal como de las Unidades Centinelas

A continuación, se presentan los aislamientos de los virus de los pacientes internados, residentes de la CABA, sin incluir SARS COV-2.

Gráfico 12. Casos notificados Internados con diagnóstico etiológico (sin SARS COV-2). Residentes de CABA. SE 19-2022 a SE 48 2023. n=2303.




Fuente: SNVS^{2.0}

Como se visualiza en el gráfico, los mayores aislamientos dentro de los pacientes internados son de VSR, que además se adelanta un par de semanas en comparación de años anteriores. En las últimas semanas, se observa un aumento de Rinovirus.

En el siguiente gráfico se muestran los casos con aislamiento de SARS COV-2 en pacientes internados residentes de la Ciudad.


Gráfico 13. Casos Internados con diagnóstico etiológico de SARS-CoV-2. Residentes de CABA. SE 19-2022 a SE 48 2023. N=4295.



Fuente: SNVS^{2.0}

En el siguiente gráfico se representan los subtipos en los aislamientos de Influenza en internados residentes de la Ciudad.


Gráfico 14. Casos notificados de Influenza A y B en Internados Residentes de CABA. SE 21-2022 a SE 48 2023. n=659.



Fuente: SNVS^{2.0}


En el siguiente gráfico se presentan los casos notificados en internación y sus tasas por rango de edad.

Gráfico 15. Casos y tasa de notificados (x 10.000 habitantes) en Internados Residentes de CABA. SE 1 a 48 2023. n=8902*.



Fuente: SNVS^{2.0} * Se excluyen la categoría "Sin especificar edad"


A continuación, se detallan los residentes de CABA internados en UCI por grupos etarios en el corriente año.



Del total de los residentes internados del año en curso (8913), el 7,2% (639 casos) requirió internación en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), correspondiendo el 53,5% a pacientes masculinos. Al 50,4% de los pacientes en UCI se ha podido realizar diagnóstico etiológico por biología molecular, correspondiendo el 30,4% a pacientes con COVID-19, seguido por el 22,4% a pacientes con VSR. Al 10,7% de los pacientes se ha detectado Influenza A sin subtipificar.

En el siguiente gráfico se presentan los casos internados y fallecidos desde la SE 1 a la 48 del corriente año.

Gráfico 17. Casos notificados de internados y fallecidos. Residentes de CABA
SE 1 a 48 2023. n=8913.



Fuente: SNVS^{2.0}

Con respecto a la caracterización de los fallecidos, el 90,1% de los casos pertenecían al grupo etario de 60 años o más, predominando el sexo femenino.

Del total de los fallecidos, el 36,4% de los casos contaron con diagnóstico etiológico, de los cuales, el 76,9% correspondió a SARS-CoV-2 y el 16,9% a Influenza A sin subtipificar.

II.3.E. Vigilancia de SARS-CoV-2, influenza y otros virus respiratorios (OVR) en Unidades de Monitoreo de Ambulatorios (UMA)


El objetivo de esta estrategia es mantener la vigilancia y monitoreo de COVID-19 en pacientes ambulatorios en todos los grupos de edad en las 24 jurisdicciones del país logrando una representatividad geográfica. Adicionalmente, entre aquellos casos que cumplen con la definición de ETI, se realiza un muestreo aleatorio o sistemático para el estudio de SARS-CoV-2, influenza y VSR por rt-PCR.

En la ciudad de Buenos Aires, durante el año 2022 funcionaron las Unidades de Monitoreo de Ambulatorios (UMA) en el Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia” y el Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez”. A partir de 2023, se incorpora a los vigentes, el Hospital de Infecciosas “Francisco Javier Muñiz”.

Desde la SE 18 del 2022 hasta la SE 48 del año en curso, se han realizado 436.852 consultas a los Unidades de Febriles, siendo 58,5% residentes de CABA. Del total de los pacientes ambulatorios, el 25,7% (65.785 casos) sospechosos de SARS-CoV-2.

Desde el comienzo de la implementación de la estrategia, SE 18 del 2022 a la SE 48 del año en curso, 2476 muestras fueron seleccionadas en el muestreo sistemático. De las mismas, el 61,8% corresponden a residentes de la jurisdicción.

Gráfico 18. Casos totales notificados de SARS-CoV-2 según clasificación (confirmado/ descartado) en UMAs, SE 18-2022 a SE 48 2023. N=436.852. CABA




Fuente: SNVS^{2.0}

Cabe destacar que las notificaciones para los eventos UMA presentan una baja en las últimas semanas debido a un retraso en la notificación.

En el siguiente gráfico se representan los tipos de virus que se aislaron en pacientes ambulatorios seleccionados residentes de la Ciudad.

Gráfico 19. Casos notificados por UMA según diagnóstico. Residentes de CABA. SE 22-2022 a SE 48 2023. n=553.




Fuente: SNVS^{2.0}

Se puede observar en el gráfico que a partir de la semana 19 comienza a detectarse casos de Influenza A, siendo predominante a partir de la SE 22. La mayor notificación para el VSR se evidencia en la SE 22.

En el siguiente gráfico se representan los subtipos en los aislamientos de Influenza en pacientes ambulatorios seleccionados residentes de la Ciudad.

Gráfico 20. Casos totales notificados de Influenza A y B en pacientes ambulatorios. Residentes de CABA. SE 22-2022 a SE 48 2023. N=474




Fuente: SNVS^{2.0}

II.3.F. Vigilancia de SARS-CoV-2, influenza y otros virus respiratorios (OVR) No UMA

En el siguiente apartado se analizarán los casos notificados bajo el evento “COVID-19, Influenza y OVR en ambulatorios (No UMAs)” con especial detención en aquellos casos que se encuentran confirmados de COVID-19 para evaluar cómo se encuentra la situación epidemiológica actual.

En el siguiente gráfico se presenta el porcentual de las notificaciones por todos los virus y el de COVID realizados en la SE 01-48 del 2023.


Gráfico 21. Proporción de casos notificados de COVID y otros virus.
Residentes de CABA. SE 1-48 2023. N=62.878.



Se evidencia un aumento de los casos de COVID desde la SE 29 a la 39 y un pico en la SE 47. Sin embargo, los valores se encuentran por debajo de lo que sucedió en el año pasado.

A continuación, se expone la caracterización de los casos confirmados de COVID según grupo etario.

Gráfico 22. Casos y tasa de COVID (x 10.000 habitantes).
Residentes de CABA. SE 1 a 48 2023. n=10.433*.




De la misma manera que se presentó en el apartado de Internados, los casos confirmados de COVID se concentran en los mayores de 30 años. La mayor cantidad de casos se encuentran en el grupo de 40 a 49 años, sin embargo, la tasa más elevada se concentra en el grupo de 70 a 79 años.

Con respecto a la distribución por sexo, el 61,5% corresponde al sexo femenino.

En cuanto a la circulación de variantes de COVID se muestran a continuación una serie histórica de las variantes desde el 2021 hasta la SE 48 del 2023.

Gráfico 23. Casos y tasa de COVID (x 10.000 habitantes).
Residentes de CABA. SE 1 a 48 2023. n=3674.



Fuente: SNVS^{2.0}

Del gráfico podemos observar que, durante el año 2021 predominaron las variantes Delta y Lambda. Luego, desde el año 2022 hasta la SE 47 del 2023, la variante Omicrón y sus linajes dependientes fueron los más prevalentes.

III. Vigilancia de Enfermedades transmitidas por el Mosquito *Aedes aegypti*

III.1. INTRODUCCIÓN

III.1.A. Inicio presentación temporada 2023/2024

En este boletín epidemiológico se da comienzo a la presentación periódica del análisis de las enfermedades transmitidas por el mosquito *Aedes aegypti* (ETMAa) correspondiente a la temporada 2023/2024. Esta temporada se extiende desde la SE 27 de 2023, iniciada el pasado el 2 de julio, hasta la finalización de la SE 26 del próximo año.

Una síntesis de la información referida a la temporada 2021/2022 se encontrará en el BES N° 360 disponible en: <https://buenosaires.gob.ar/salud/boletines-epidemiologicos-semanales-2023>

Les recordamos que la información específica para el personal de salud se encuentra en el siguiente link

<https://buenosaires.gob.ar/informacion-para-equipos-de-salud>

dentro de la página de ETM del Ministerio de Salud de la Ciudad

III.1.B. Sobre el informe de las ETMAa

Las enfermedades transmitidas por mosquitos del género *Aedes aegypti* (ETMAa) constituyen un problema de salud pública en diversos países del mundo, incluyendo los de la región de las Américas. La transmisión resulta de la interacción entre personas, el hábito antropofílico de la hembra de esta especie de vector, las características de los diferentes virus y factores ambientales. Los movimientos humanos locales (casa a casa) favorecen la dinámica de transmisión, importante para la amplificación de estos virus y su posterior diseminación, lo cual, por otra parte, define patrones espaciales de incidencia y causa una marcada heterogeneidad en las tasas de transmisión. Por otra parte, especialmente en relación con el dengue, el agrupamiento de casos espaciotemporal determina que haya viviendas que contribuyen desproporcionadamente con la amplificación y diseminación viral.

Además de las necesarias actividades de prevención para la eliminación de criaderos del mosquito, es relevante la implementación adecuada de los mecanismos

de vigilancia epidemiológica. La detección temprana de estas enfermedades permite la generación de acciones oportunas y políticas sanitarias.

De acuerdo a los escenarios teóricos de riesgo que históricamente presenta la Ciudad de Buenos Aires, según la presencia o no del vector y la ocurrencia de casos, nos encontramos en el **Escenario 2: Riesgo medio**.

Se presentan los detalles más abajo, a continuación del detalle de la situación en relación con las ETMAa en la Región de las Américas y en nuestro país.

Escenario 0	Escenario 1: Riesgo Bajo	Escenario 2: Riesgo Medio	Escenario 3: Riesgo Alto
Julio-Septiembre	Octubre- Noviembre	Diciembre- Febrero	Marzo-Junio
Presencia de huevos del vector sin actividad larvaria y sin ocurrencia de casos	Baja presencia del vector sin existencia de casos de Dengue y otras ETMAa	Presencia del vector con existencia de casos sospechosos de dengue y otras ETMAa (Generalmente con antecedente de viaje).	Presencia del vector con existencia de casos confirmados de dengue y otras ETMAa (con y sin antecedente de viaje)

III.1.C. Nota metodológica

La presentación sistemática de los datos de las ETMAa tiene como objetivo describir la notificación oficial realizada al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS), donde hasta el 28 de abril de 2018 se analiza la integración de los módulos C2 y SIVILA y a partir de esa fecha, los datos provenientes del SNVS^{2.0}.

Para los informes se analizan las notificaciones cuyo lugar de residencia corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y aquellos donde la misma no presenta registros (residencia desconocida).

Para una mayor comprensión de las notificaciones de las ETMAa, se considera una determinación por paciente, por lo cual, si una persona es estudiada para diferentes eventos, dentro de las ETMAa, se considera solo uno de ellos teniendo en cuenta el algoritmo diagnóstico para estos eventos.

III.1.D. Situación regional²

A continuación, se presentan los casos de dengue, dengue grave y fallecimientos según subregión de las Américas informados en 2023 hasta el 07/12/2023.

²<https://www3.paho.org/data/index.php/es/temas/indicadores-dengue/dengue-regional/506-dengue-reg-ano-es.html>

Tabla 1. Casos de dengue y dengue grave según subregión de las Américas.
Año 2023 (SE 1 a 49).

REGION	TOTAL DE CASOS DE DENGUE	DENGUE GRAVE	MUERTES
América del Norte	1296	17	0
Caribe Latino	19287	197	19
Caribe no Latino	27027	58	17
Cono Sur	3043869	1474	1091
Istmo Centroamericano y México	509035	1593	258
Subregión Andina	550210	3283	640
Total Las Américas	4150724	6622	2025

Fuente: Plataforma de Información en Salud de las Américas (PLISA)

De los números presentados anteriormente, la mayoría de los casos de la región corresponden a Brasil (2.909.404 notificaciones, 1474 casos graves y 1011 muertes). Con respecto a la circulación de serotipos, actualmente se encuentran DEN 1, 2 y 3, la mayoría de las localidades del país presentan circulación concomitante de DEN 1 y 2³.

Luego de Brasil, sigue Perú con 271.279 y el Estado Plurinacional de Bolivia con 144.065 notificaciones⁴.

Con respecto a F. Chikungunya, en igual período se presentaron 143.739 casos probables, con una tasa de incidencia de 67,4 casos por 100.000 habitantes, correspondientes a una reducción del 41% si se compara con el año 2022; la región Sudoeste presenta la mayor incidencia de casos.

En relación a los casos causados por el virus Zika, en 2023 hasta la SE 32 ocurrieron 8425 casos, que corresponde a una tasa de incidencia de 4,1 casos por 100.000 habitantes; con una reducción del 20,8% con respecto a 2022.

III.1.E. Situación actual en Argentina⁵

Desde el Ministerio de Salud de la Nación se informó que desde la SE 01/2023 hasta el 47/2023, se han registrado 133.344 casos de dengue de los cuales 1628 fueron importados. La región con mayor cantidad de casos es el NOA seguido de la región Centro.

En cuanto a la circulación, en el país predominó el DENV-2 identificándose en el 78,82% de los casos sub tipificados (en todas las provincias del NOA y en la mayoría de la región Centro); seguido de DENV-1, en el 21,14%; y DENV-3 en muy baja circulación, con el 0,04%. En la región del NEA predominó en casi todas las provincias DENV-1, con

³<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2023/boletim-epidemiologico-volume-54-no-13/view>

⁴<https://www3.paho.org/data/index.php/es/temas/indicadores-dengue/dengue-regional/506-dengue-reg-ano-es.html>

⁵<https://bancos.salud.gob.ar/recurso/boletin-epidemiologico-nacional-n-680-se-47-2023>

excepción de Formosa donde se detectó una proporción mayor de casos de DENV-2 entre los subtipificados.

En las últimas 4 semanas, 24 departamentos pertenecientes a 4 jurisdicciones de la región NEA registraron casos **confirmados** autóctonos o en investigación: **Chaco** (1° de Mayo, 25 de Mayo, 9 de Julio, Bermejo, Comandante Fernández, General Donovan, General Güemes, Independencia, Libertad, Libertador General San Martín, Maipú, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Fernando, Sargento Cabral y 2 de Abril), **Corrientes** (Capital y San Luis del Palmar), **Formosa** (Patiño, Pilcomayo y Capital) y **Misiones** (Capital, Guaraní y Montecarlo). Con respecto al caso confirmado en el Noroeste de Buenos Aires, se determinó que cuenta con el antecedente de viaje a México. Los otros 162 departamentos que registraron casos autóctonos durante este año han pasado 28 días o más sin registrar nuevos casos.

Durante la SE 47 se notificó un nuevo caso fallecido en la provincia de Formosa. Hasta SE 47/2023, se registraron 66 casos fallecidos, con una letalidad del 0,05%.

III.2. ETMAA EN LA CABA


Desde el inicio de la temporada 2023/2024 en la SE 27/2023 (2 de julio) hasta la SE 50/2023 (10 al 16 de diciembre), se notificaron 348 casos sospechosos de ETMAA, todos correspondientes a Dengue.

Se recuerda que en la detección y notificación de los casos están involucrados todos los efectores asistenciales, tanto del sector público como privado y de las OOSS.

III.2.A. Antecedentes y situación actual

En el siguiente gráfico, se muestran los casos notificados de residentes de la Ciudad, para todas las ETMAA desde la SE 26 de 2015, hasta la SE 50 de 2023.

Gráfico 24. Casos notificados de ETMAa según semana epidemiológica. Residentes de la CABA. Años 2016 (SE 1-52, n=12.098), 2017 (SE 1-52, n=636), 2018 (SE 1-52, n=623), 2019 (SE 1-52, n=385), 2020 (SE 1-53, n=12.302), 2021 (SE 1-52, n=433), 2022 (SE 1-52, n=200), 2023 (SE 1-50, n=21707).



Fuente: SNVS, SIVILA-C2, SNVS^{2.0}


III.3. DENGUE

III.3.A. Situación en la temporada 2023/2024 (SE 27 a SE 50 2023)

Entre las SE 27 2023 y 50 de 2023 fueron notificados 348 casos con sospecha de dengue, 99 de ellos sin antecedente de viaje y 44 con antecedente de viaje a áreas reconocidas de transmisión; mientras que en los restantes casos el dato no fue consignado en el SNVS^{2.0}.


El siguiente gráfico da cuenta de la clasificación de los casos sospechosos de dengue notificados en 2023 entre las SE 27 a 50.

Gráfico 25. Notificaciones de dengue según clasificación. Residentes de la CABA. Año 2023. SE 27-50 (n=348).



A continuación, se ampliará la información sobre los casos confirmados y probables hasta la SE 50 del año en curso.

Gráfico 26. Casos confirmados y probables de dengue por semana epidemiológica. Residentes de la CABA. Año 2023. SE 27-50 (n=37).




Fuente: SNVS^{2.0}

Se observa que la presencia de casos confirmados fue continua en líneas generales a excepción de algunas semanas, siendo la misma sostenida por casos importados y no autóctonos de la Ciudad de Buenos Aires.

En el siguiente gráfico observaremos la distribución por comunas y su antecedente de viaje.

Gráfico 27. Casos confirmados y probables de dengue según comuna de residencia y antecedente de viaje. Residentes de la CABA. Año 2023. SE 27-50 (n=37).



Fuente: SNVS^{2.0}

Cabe destacar que el caso de la comuna 13 sin antecedente de viaje, corresponde a un paciente con resultado de test rápido positivo (que no se considera diagnóstico para periodos interbrote) el cual la muestra no fue derivada al centro de referencia para obtener un resultado concreto.

El caso de la comuna 7 sin antecedente de viaje, corresponde a un paciente también con resultado de test rápido positivo el cual ha sido derivado al centro de referencia para obtener mayor información lo cual se encuentra pendiente al cierre de ésta edición.

El confirmado de la Comuna 11 no cuenta con antecedente de viaje, dando positivo en la PCR en el establecimiento de atención. La muestra se deriva a centro de referencia de la Ciudad obteniendo DEN-2 en la serotipificación.

Se observa que los casos confirmados correspondieron a casi todas las comunas con excepción de la comuna 9, siendo la región Centro con mayor cantidad de casos (59,5%)

Con respecto a los viajes, el 64,9% de los casos confirmados (24) contaron con viajes al exterior y provincias del país que aún mantienen circulación viral.


En el 86% (18 casos) de los casos se obtuvo la serotipificación, siendo el DEN-3 el serotipo con mayor prevalencia (7 casos) donde la mitad presentaron viaje a México. El resto correspondieron a DEN-1 (6 casos) y DEN-2 (5 casos).

Existieron tres casos confirmados con nexo epidemiológicos que correspondieron a familiares de pacientes con dengue provenientes del Chaco.

Continuamos realizando una ardua tarea para mejorar la información proveniente del sistema a fin de evitar los casos sin datos de viaje.

A continuación, se expone la distribución de los casos por grupo etario

Gráfico 28. Casos confirmados de dengue según grupo etario. Residentes de la CABA. Año 2023. SE 27-50 (n=37).



Hasta la SE 50 no se presentan casos confirmados en menores de 15 años. Predomina el sexo femenino con el 64% de las notificaciones.

En cuanto a la evolución clínica, sólo dos casos requirieron internación sin necesidad de permanecer en UTI los cuales recibieron el alta sin secuelas clínicas. No se registran casos fallecidos al momento de la edición de este boletín.

Es importante considerar que los síndromes febriles inespecíficos pueden estar asociados a otras patologías, como enfermedad por virus Zika, fiebre Chikungunya, encefalitis de San Luis, hantaviriosis y leptospirosis, entre otras. Se recomienda tener en cuenta estos distintos diagnósticos diferenciales de acuerdo a la presentación clínica y los antecedentes epidemiológicos encontrados.

En el contexto actual, se refuerzan las actividades de control y realización de los estudios de foco desde la sospecha de los casos con el fin de detección de posibles febriles, tareas de prevención y promoción de la salud.

III.3.B. Casos históricos y comparación con los actuales

A continuación, se presenta la situación en la CABA en relación a los casos de dengue, comparando iguales semanas epidemiológicas de los 6 últimos años y el año en curso, incluyendo el antecedente de viaje.

Es importante destacar que en la temporada 2020/2021 los casos fueron notificados en el primer semestre del año 2021.

Tabla 2. Casos confirmados de dengue según antecedente de viaje por temporadas.
Residentes de la CABA. 2016-2023. (Año 2023-2024 hasta SE 50)

Antecedente de viaje	2015 - 2016	2016 - 2017	2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	2020 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2023	2023 - 2024
SI	484	1	33	27	354	3	5	169	19
NO	5678	1	115	28	6920	1	0	7287	0
Sin datos	232	0	1	4	7	0	1	4794	4
TOTAL	6394	2	149	59	7281	4	6	12250	23

Fuente: SNVS, SIVILA-C2, SNVS^{2.0}

