

Brucelosis canina

Instituto de Zoonosis
Luis PASTEUR



Buenos
Aires
Ciudad



Brazos
Abiertos

Desarrollado por el Area de Educación
para la Promoción de la Salud del Instituto
de Zoonosis Luis Pasteur.



Buenos
Aires
Ciudad



Brazos
Abiertos

Brucelosis canina

Es una enfermedad, causada por la bacteria ***Brucella canis***, que puede afectar a perros de ambos sexos y en ocasiones también transmitirse en forma accidental al ser humano.

Esta bacteria puede estar presente en secreciones vaginales y prostáticas, semen, orina o en el caso de producirse un aborto, en las membranas placentarias y los fetos contaminados.

¿Cómo se transmite en los caninos?

- Por transmisión sexual.
- De la madre a los fetos a través de la placenta.
- Por el lamido u hociqueo de restos de placenta, orina o secreciones infectadas con la bacteria.

El contacto de una persona con fetos abortados, placentas, o secreciones de animales infectados, implica la posibilidad de contagio.

Signos y síntomas de la brucelosis

→ En los caninos:

Infertilidad. Aborto en las perras gestantes. Nacimiento de cachorros débiles o muertos. Dolor en el aparato genital del macho (por lo que suele lamerse en forma constante).

Si observas estos síntomas en el animal, concurre a la veterinaria o al Instituto Pasteur y evitá el contacto con las secreciones del animal.

→ En las personas:

Malestar generalizado. Fiebre. Pérdida de peso. Dolor articular y muscular.

Si estuviste en contacto con un canino con alguno de los signos o síntomas mencionados, realizá de inmediato la consulta con un médico.

Para tener en cuenta



Si adoptás o comprás un perro, realizá siempre una consulta clínica con el veterinario para descartar la enfermedad, ya que a veces puede no presentar síntomas (asintomática).



Si se produjera un aborto en una hembra es importante usar guantes y doble bolsa de residuos para eliminar el o los fetos y membranas, evitando todo contacto con estos elementos.



Mantené siempre los ambientes limpios. Desinfectá con lavandina diluída en agua, según la proporción indicada en su envase o con alcohol al 70%.

Un animal con **prueba positiva para brucelosis** podría permanecer infectado a pesar de haber recibido tratamiento médico. Por lo tanto, ante esta situación, se recomienda la esterilización quirúrgica.

La castración es la medida sanitaria de elección para prevenir la enfermedad.



Instituto de Zoonosis

Luis Pasteur

Av. Díaz Vélez 4821, CABA



4958-9900/9903