




N.C.: ***Cupania vernalis***

N.V.: Camboatá colorado. Ramo

Familia: **Sapindaceae**

Árbol de 6– 10 m de altura. El tronco alcanza hasta 80 cm de diámetro. Polígamo dioico, de follaje persistente, no tiene espinas ni látex o resina. Las hojas son no carnosas, alternas, pinnaticompuestas, con el borde aserrado, de color verde brillante cuando están maduras, pero las hojas jóvenes tienen un color rojizo a cobrizo característico. Las flores son pequeñas, blanco amarillentas, en espigas. Los frutos son carnosos consisten en 1 cápsula que al abrirse expone 1 a 3 semillas, negras brillantes, con un arilo anaranjado en la base. Consiste en una cápsula que al abrirse expone 1 a 3 semillas, negras brillantes, con un arilo anaranjado en la baseol.



VIVERIZACIÓN

Tipo de germinación
Hipógea

Tratamiento pre germinativo
No requiere. Se recomienda
Desinfectar las semillas previo a la siembra


Porcentaje de germinación
Alto 80 %

Metodología de siembra
Siembra directa; una semilla por tubete

Envase
Tubete forestal de 600 cm3.

Sustrato
Growmix multipro (mezcla profesional terrafertil s.A.),

Granulometría
Fina a media; ph: 5 a 5,8; ce (ms/cm): 0.20–0.6; nitrato (soluble ppm): 200–270; fósforo (soluble ppm): 15–40; potasio (soluble ppm): 200–300; humedad (%): 55 y 65; densidad seca (kg/m3): 140–180; mo (%): 80–85; c/n: 15–25.



TIEMPO DE VIVERIZACIÓN

6 meses

Establecimiento
temperatura: 20°C–25°C
Fotoperíodo: 8 hs de luz

Período de germinación
De 3 a 5 días después de la siembra

Expansión de cotiledones
2 a 3 días después de germinación.

1ra hoja verdadera
8–10 días desde la siembra.

Período de crecimiento rápido
De 3 a 4 meses

Período de rustificación
1 a 2 meses. A partir de los 20 cm de altura

Plagas y enfermedades
No se registraron durante el período de viverización



CALENDARIO FENOLÓGICO:

CIUDAD DE BUENOS AIRES

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
FL				●	●	●	●	●				
FR										●	●	●

YERBA BUENA, TUCUMÁN

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
FL				●	●	●	●	●				
FR								●	●	●	●	●

ALMACENAMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE LAS SEMILLAS:

No se encontraron datos
bibliográficos para la
conservación de semillas.
La durabilidad es corta luego
de la cosecha.

CARACTERÍSTICAS DE CRECIMIENTO:



Riego
moderado



Media
sombra



Crecimiento
Lento

CARACTERÍSTICAS DE USO:

Forestal
Moderable
Ornamental



Jardín Botánico
de la Ciudad
Carlos Thays

Autores: Lorena Gimenez. Darío Bernhart