



N.C.: **Terminalia Triflora**

N.V.: Lanza amarilla

Familia: **Combretaceae**

Es un arbusto o árbol, de 10 a 20 m. No tiene espinas ni látex o resina. La corteza algo rugosa, de color castaño claro. La parte inferior del fuste puede presentar costillas marcadas que conectan con las raíces.

Las hojas son no carnosas, simples, alternas, a menudo agrupadas en los extremos de las ramas. Caducifolio. En la cara inferior las axilas de las nervaduras principales tienen un mechón de pelos característico.

El borde es entero y no tienen perfume.

Las flores son muy pequeñas, amarillentas, en espigas.

El fruto, seco, es una sámara con dos alas laterales.

La diseminación es anemófila.

CALENDARIO FENOLÓGICO:

CIUDAD DE BUENOS AIRES

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
FL									●	●	●	●
FR	●	●	●	●							●	●

YERBA BUENA, TUCUMÁN

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
FL								●	●	●		
FR									●	●	●	●

VIVERIZACIÓN

Tipo de germinación
Epígea.

Tipo de semillas
Recalcitrante

Tratamiento pre germinativo
No requiere.


Porcentaje de germinación
Bajo

Metodología de siembra
Siembra directa; una semilla por tubete

Envase
Tubete forestal de 600 cm³.

Sustrato
Growmix multipro (Mezcla profesional Terrafertil S.A.),

Granulometría
Fina a media; Ph: 5 a 5,8; Ce (mS/cm): 0.20–0.6; Nitrato (soluble ppm): 200–270; Fósforo (soluble ppm): 15–40; Potasio (soluble ppm): 200–300; Humedad (%): 55 y 65; Densidad seca (kg/m³): 140–180; MO (%): 80–85; C/N: 15–25.



ALMACENAMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE LAS SEMILLAS:

Las semillas pierden viabilidad rapidamente y presentan un bajo porcentaje de germinación.

TIEMPO DE VIVERIZACIÓN

8 a 10 meses

Establecimiento
Temperatura: 20°C–25°C
Fotoperíodo: 8 hs de luz

Período de germinación
30 días después de la siembra

Expansión de cotiledones
2 a 3 días después de germinación.

1ra hoja verdadera
30 días desde la siembra.

Período de crecimiento rápido
De 4 a 5 meses

Período de rustificación
2 a 3 meses. A partir de los 20 cm de altura

Plagas y enfermedades
No se registraron durante el período de viverización



CARACTERÍSTICAS DE CRECIMIENTO:



Riego
moderado



Media
sombra



Crecimiento
lento

CARACTERÍSTICAS DE USO:

Forestal
Maderable
Ornamental



Jardín Botánico
de la Ciudad
Carlos Thays

Autores: Lorena Gimenez. Darío Bernhart